

Kapitel 6

Anfangswertprobleme

6.1 Einführung

Bemerkung 6.1 *Gewöhnliche Differentialgleichungen, Anfangswertprobleme.* Gewöhnliche Differentialgleichungen sind Gleichungen, bei denen eine Funktion einer skalaren Variablen $y(x)$ gesucht ist, welche eine Gleichung der Form

$$F(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n)}(x)) = 0 \quad (6.1)$$

erfüllt. Differentialgleichungen erhält man bei der Modellierung von Prozessen aus der Natur und der Wirtschaft.

Um eine konkrete Lösung von Differentialgleichungen vom Typ (6.1) zu berechnen, braucht man noch Zusatzinformationen. Sind geeignete Daten zu einem gewissen Punkt x_0 gegeben, so spricht man von Anfangswertproblemen. \square

Beispiel 6.2 *Die Schwingungsdifferentialgleichung.* Betrachte die Schwingung einer Feder. Es bezeichne, bereits als entdimensionierte (ohne physikalische Einheit) Größen,

- t – Zeit,
- $y(t)$ – Ort,
- $y'(t)$ – Geschwindigkeit,
- $y''(t)$ – Beschleunigung,
- y_0 – Ursprungslage der Feder im Nullpunkt des Koordinatensystems $t = 0$.

Aus dem Newtonschen Gesetz $F = ma$ folgt mit $m = 1$, $a = y''(t)$, der Federkonstanten $\beta > 0$ und der Reibungskonstanten $\alpha > 0$

$$y''(t) = \underbrace{-\beta y(t)}_{\text{Rückstellkraft}} \underbrace{-\alpha y'(t)}_{\text{Reibungskraft}} \underbrace{+g(t)}_{\text{äußere Kraft}} \quad (6.2)$$

Das ist die Schwingungsdifferentialgleichung. Hier wird in (6.2) der Fall $g(t) = 0$ betrachtet.

Bei der Federschwingung sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Situationen möglich:

1. Die Reibungskraft ist groß im Vergleich zur Federkraft. Dann wird die Feder nicht wirklich schwingen, sondern sich einfach in ihre Ursprungslage y_0 zurückbegeben.
2. Die Reibungskraft ist klein im Vergleich zur Federkraft. Dann wird man eine (gedämpfte) Schwingung erhalten.

1. Fall: große Reibungskraft im Vergleich zur Federkraft. Man macht den Ansatz für eine exponentiell abklingende Funktion

$$y(t) = ae^{bt}, \quad b < 0, a \neq 0.$$

Einsetzen dieses Ansatzes in (6.2) ergibt

$$ab^2 e^{bt} = -\beta a e^{bt} - \alpha a b e^{bt} = -a(\beta + \alpha b) e^{bt}.$$

Diese Gleichung ist genau dann erfüllt, falls

$$b^2 = -(\beta + \alpha b) \iff b_{1,2} = -\frac{\alpha}{2} \pm \sqrt{\frac{\alpha^2}{4} - \beta}.$$

Da b reell sein soll, erhält man damit eine mathematische Bedingung dafür, dass die Reibungskraft groß im Vergleich zur Federkraft ist:

$$\frac{\alpha^2}{4} \geq \beta.$$

Im Fall, dass die Gleichheit in dieser Beziehung nicht gilt, erhält man zwei negative Lösungen für b , also auch zwei Lösungen aus dem Ansatz. Man rechnet leicht nach, dass jede Linearkombination eine Lösung von (6.2) ist

$$y(t) = a_1 e^{b_1 t} + a_2 e^{b_2 t}, \quad a_1, a_2 \in \mathbb{R} \implies \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = 0.$$

Es wird gezeigt, dass diese Kurve höchstens eine Nullstelle besitzt. Umstellen der Nullstellengleichung ergibt

$$1 = -\frac{a_2}{a_1} e^{(b_2 - b_1)t}, \quad a_1 \neq 0.$$

Wegen der strengen Monotonie der Exponentialfunktion kann es höchstens einen Wert t geben, der diese Gleichung erfüllt. In Abbildung 6.1 ist eine mögliche Lösung im Falle der Anfangsauslenkung $y(0) = 1$ dargestellt, für die Parameter $\alpha = 3, \beta = 1, a_1 = -1, a_2 = 2$.

Im Fall der Gleichheit $\alpha^2/4 = \beta$ kann man nachrechnen, dass neben $e^{-\alpha t/2}$ auch $t e^{-\alpha t/2}$ eine Lösung von (6.2) ist und die allgemeine Lösung hat die Gestalt

$$y(t) = (a_1 + a_2 t) e^{-\alpha t/2}, \quad a_1, a_2 \in \mathbb{R} \implies \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = 0.$$

Beide Fälle werden als aperiodischer Kriechfall bezeichnet.

2. Fall: kleine Reibungskraft im Vergleich zur Federkraft. In diesem Fall wird man eine gedämpfte Schwingung erwarten. Die Dämpfung kann man wieder mit einer Exponentialfunktion beschreiben und die Schwingung mit einer Winkelfunktion. Ein geeigneter Ansatz ist

$$y(t) = e^{at} (c_1 \cos(bt) + c_2 \sin(bt)), \quad a < 0, b \neq 0.$$

Man schreibt diesen Ansatz zunächst in anderer Form. Seien $\lambda \in \mathbb{R}$ und $A \in \mathbb{R}^+$. Setzt man $c_1 = A \cos \lambda, c_2 = A \sin \lambda$, so erhält man mit einem Additionstheorem für die Kosinusfunktion

$$y(t) = A e^{at} (\cos \lambda \cos(bt) + \sin \lambda \sin(bt)) = A e^{at} \cos(bt - \lambda).$$

Einsetzen in (6.2) liefert

$$A e^{at} \left((a^2 - b^2 + \alpha a + \beta) \cos(bt - \lambda) - b(2a + \alpha) \sin(bt - \lambda) \right) = 0.$$




Abbildung 6.1: Beispiele für Lösungen der Schwingungsdifferentialgleichung, links: aperiodischer Kriechfall, rechts: gedämpfte Schwingung.

Das ist genau dann erfüllt, wenn der letzte Faktor für alle t verschwindet, also wenn

$$a = -\frac{\alpha}{2}, \quad b = \pm \sqrt{a^2 + \alpha a + \beta} = \pm \sqrt{\frac{\alpha^2}{4} - \frac{\alpha^2}{2} + \beta} = \pm \sqrt{-\frac{\alpha^2}{4} + \beta}.$$

gelten. Die Lösung ist eine gedämpfte Schwingung, siehe in Abbildung 6.1 für $\alpha = 0.1, \beta = 3, \lambda = 1, A = 2$ und den Anfangswert $y(0) = 1$.

In beiden Fällen stellt man fest, dass man aus dem gegebenen einen Anfangswert noch keine Lösung des Anfangswertproblems bestimmen kann, da man zwei unbekannte Koeffizienten festlegen muss. Dazu braucht man beispielsweise zwei Bedingungen für den Anfangspunkt, zum Beispiel für $y(0)$ und $y'(0)$. \square

Bemerkung 6.3 Allgemeine Situation. Im Allgemeinen kann man eine Differentialgleichung nur in Spezialfällen analytisch lösen. Generell kann man jedoch Existenz und Eindeutigkeit einer Lösung von (6.1) mit geeigneten Anfangsbedingungen untersuchen. Zudem kann man sich mit Hilfe von numerischen Näherungsverfahren eine Vorstellung von der Gestalt der Lösung verschaffen, obwohl man keine explizite Formel für diese besitzt. \square

6.2 Grundbegriffe, einige integrierbare Typen von gewöhnlichen Differentialgleichungen 1. Ordnung

Bemerkung 6.4 Inhalt. Dieses Kapitel behandelt einige Typen von gewöhnlichen Differentialgleichungen 1. Ordnung, bei denen man, teilweise nur in Spezialfällen, die Lösung analytisch berechnen kann. Weitere Typen finden Interessenten im Anhang C. \square

6.2.1 Definitionen und Beispiele

Definition 6.5 Gewöhnliche Differentialgleichung 1. Ordnung, explizite gewöhnliche Differentialgleichung 1. Ordnung. Eine gewöhnliche Differentialgleichung wird von erster Ordnung genannt, wenn in ihr keine höhere Ableitung von $y(x)$ als die erste Ableitung vorkommt. Die allgemeine gewöhnliche Differentialgleichung 1. Ordnung lautet

$$F(x, y(x), y'(x)) = 0.$$




Abbildung 6.2: Skizze zur geometrischen Interpretation.

Eine Funktion $y(x)$ ist Lösung dieser Gleichung in einem Intervall $I \subset \mathbb{R}$ wenn $y(x)$ in I differenzierbar ist und $F(x, y(x), y'(x)) = 0$ für alle $x \in I$ gilt.

Die gewöhnliche Differentialgleichung 1. Ordnung wird explizit genannt, wenn man sie in der Form

$$\frac{dy}{dx} = y'(x) = f(x, y(x)) \quad (6.3)$$

schreiben kann, wobei $f(x, y)$ eine auf einer Menge G der (x, y) -Ebene erklärte reellwertige Funktion ist. Eine Funktion $y : I \rightarrow \mathbb{R}$ ist Lösung von (6.3), wenn $y(x)$ in I differenzierbar ist und für alle $x \in I$ gilt

$$\text{ist } (x, y(x)) \in G, \quad \text{dann } y'(x) = f(x, y(x)).$$

□

Beispiel 6.6 *Organisches Wachstum.* Die absolute Wachstumsrate von Bakterienkulturen auf unerschöpflichem Nährboden ist proportional zur Anzahl N der im Augenblick t vorhandenen Bakterien

$$N'(t) = \alpha N(t). \quad (6.4)$$

Hierbei ist α die relative Wachstumsrate der Bakterienart. Die Lösung dieser Differentialgleichung ist eine differenzierbare und demzufolge stetige Funktion. Das steht streng genommen im Widerspruch zur Tatsache, dass N eine natürliche Zahl sein muss. In der Praxis ist N jedoch sehr groß, so dass man mit dem mathematischen Modell, welches durch die Differentialgleichung (6.4) gegeben ist, nur einen kleinen Modellfehler begeht. Die Lösung von (6.4) wird im Abschnitt 6.2.3 behandelt.

Für Ableitungen nach der Zeit verwendet man statt $N'(t)$ auch oft die Bezeichnung $\dot{N}(t)$. □

Bemerkung 6.7 *Geometrische Interpretation.* Die explizite Differentialgleichung (6.3) gestattet eine einfache geometrische Interpretation. Geht eine Lösung $y(x)$ von (6.3) durch den Punkt $(x_0, y_0) \in G$, das heißt $y(x_0) = y_0$, so beträgt ihre Steigung an dieser Stelle

$$y'(x_0) = f(x_0, y_0) = \tan \alpha,$$

wobei α der Anstiegswinkel ist, siehe Abbildung 6.2.

Man nennt das Tripel $(x_0, y_0, \tan \alpha) = (x_0, y_0, f(x_0, y_0))$, oder sein geometrisches Äquivalent, Linienelement. Die Gesamtheit aller Linienelemente $(x, y, f(x, y))$ heißt Richtungsfeld. Eine Kurve $y(x)$ erweist sich als Lösung der Differentialgleichung (6.3), wenn sie in das vorgegebene Richtungsfeld passt. Das heißt, in jedem Kurvenpunkt stimmt ihre Tangentenrichtung mit der Richtung des Linienelements überein. □




Abbildung 6.3: Beispiel 6.8. Richtungsfeld der Lösung.

Beispiel 6.8 *Richtungsfeld einer gewöhnlichen Differentialgleichung 1. Ordnung.* Gesucht sei die Lösung von

$$y'(x) = x, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Mit den obigen Bezeichnungen ist $f(x, y) = x$. Diese Funktion ist für konstantes x konstant. Das Richtungsfeld ist in Abbildung 6.3 skizziert.

Die Gesamtheit aller Lösungen einer Differentialgleichung nennt man allgemeine Lösung. Die allgemeine Lösung der obigen Differentialgleichung ist

$$y(x) = \frac{x^2}{2} + c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

Man sieht an diesem Beispiel, dass diese Differentialgleichung unendlich viele Lösungen besitzt. Zum anderen gibt es für jeden Punkt $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ genau eine Lösung, die diesen Punkt enthält.

In der Praxis ist es oft nicht so wichtig, alle Lösungen zu kennen, sondern eine Lösung zu finden, die durch einen vorgegebenen Punkt verläuft. \square

Definition 6.9 Anfangswertproblem, Anfangswert. Gegeben sind eine auf einer Menge $G \subset \mathbb{R}^2$ erklärte Funktion $f(x, y)$ und ein fester Punkt $(x_0, y_0) \in G$. Dann nennt man das Problem

$$y'(x) = f(x, y(x)), \quad y(x_0) = y_0$$

Anfangswertproblem (AWP). Die Nebenbedingung wird Anfangswert genannt. \square

6.2.2 Gewöhnliche Differentialgleichung mit getrennten Variablen

Definition 6.10 Gewöhnliche Differentialgleichung mit getrennten Variablen. Eine gewöhnliche Differentialgleichung der Form

$$y'(x) = f(x)g(y) \tag{6.5}$$

nennt man gewöhnliche Differentialgleichung mit getrennten Variablen. \square

Beispiel 6.11 Unbestimmtes Integral. Ein Spezialfall von (6.5) ist die Differentialgleichung

$$y'(x) = f(x).$$

Der Lösungsweg für diese Differentialgleichung ist bereits aus der Schule bekannt: unbestimmte Integration. Existiert eine Stammfunktion $F(x)$ von $f(x)$, so ist die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung

$$y(x) = F(x) + c,$$

wobei $c \in \mathbb{R}$ eine beliebige Konstante ist.

Man spricht anstelle des „Auffindens der Lösung einer Differentialgleichung“ auch oft von der „Integration einer Differentialgleichung“. \square

Satz 6.12 Existenz und Eindeutigkeit der Lösung des Anfangswertproblems. Die Funktion $f(x)$ sei im Intervall $(a, b) \subset \mathbb{R}$ und die Funktion $g(y)$ sei im Intervall $(c, d) \subset \mathbb{R}$ stetig und es gelte $g(y) \neq 0$ für alle $y \in (c, d)$. Dann ist das Anfangswertproblem

$$y'(x) = f(x)g(y), \quad y(x_0) = y_0, \quad x_0 \in (a, b), \quad y_0 \in (c, d), \quad (6.6)$$

eindeutig lösbar. Seien $G(y)$ die Stammfunktion von $1/g(y)$ mit $G(y_0) = 0$ und $F(x)$ die Stammfunktion von $f(x)$ mit $F(x_0) = 0$. Dann ist

$$y(x) = \left(G^{-1} \circ F\right)(x) = G^{-1}(F(x)) \quad (6.7)$$

die Lösung des gestellten Anfangswertproblems in einer Umgebung von x_0 . Hierbei ist $G^{-1}(y)$ die Umkehrfunktion von $G(y)$.

Beweis: Für Interessenten.

i) *Eindeutigkeit.* Angenommen, $y(x)$ sei eine Lösung des AWP (6.6) mit $y(x_0) = y_0$. Dann gilt

$$\frac{y'(x)}{g(y(x))} = f(x).$$

Da beide Funktionen dieser Gleichung stetig sind, kann man sie integrieren

$$\int_{x_0}^x \frac{y'(x)}{g(y(x))} dx = \int_{x_0}^x f(x) dx.$$

Da $G(y)$ die Stammfunktion von $1/g(y)$ ist und $F(x)$ die Stammfunktion von $f(x)$, erhält man mit dem Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung

$$G(y(x)) - \underbrace{G(y(x_0))}_{=y_0} = F(x) - \underbrace{F(x_0)}_{=0}. \quad (6.8)$$

Da $1/g(y) \neq 0$ ist, ist $G(y)$ eine streng monotone Funktion. Daraus folgt, dass die Umkehrfunktion $G^{-1}(y)$ existiert. Damit ergibt sich aus (6.8)

$$y(x) = \left(G^{-1} \circ F\right)(x) = G^{-1}(F(x)).$$

Das heißt, existiert eine Lösung des AWP (6.6), so kann man sie in der Form (6.7) darstellen. Die Eindeutigkeit folgt aus der Eindeutigkeit der Funktionen $F(x)$ und $G(y)$.

ii) *Existenz.* Man zeigt durch nachrechnen, dass (6.7) eine Lösung des AWP (6.6) ist. Es gilt

$$\begin{aligned} y'(x) &\stackrel{\text{Kettenregel}}{=} \left(G^{-1}\right)'(F(x)) F'(x) \\ &\stackrel{\text{Abl. Umkehrfunktion}}{=} \frac{1}{G'(G^{-1}(F(x)))} F'(x) \\ &\stackrel{(6.7)}{=} \frac{1}{G'(y(x))} F'(x) \end{aligned}$$

$$G'(y) \stackrel{=} {=} \frac{1}{g(y)} \quad \frac{f(x)}{\frac{1}{g(y)}} = f(x)g(y).$$

Für die Anfangsbedingung gilt

$$y(x_0) = G^{-1}(F(x_0)) = G^{-1}(0) = y_0.$$

■

Beispiel 6.13 *Differentialgleichung mit getrennten Variablen.* Betrachte

$$\begin{aligned} y'(x) &= \frac{x}{y(x)}, \quad x \in (a, b), \quad y \in (c, d), \quad 0 \notin (c, d) \\ y(x_0) &= y_0 \in (c, d). \end{aligned}$$

Mit der obigen Herangehensweise erhält man

$$f(x) = x \quad \Longrightarrow \quad F(x) = \int_{x_0}^x t \, dt = \frac{x^2}{2} - \frac{x_0^2}{2}$$

und

$$g(y) = \frac{1}{y} \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{g(y)} = y \quad \Longrightarrow \quad G(y) = \int_{y_0}^y t \, dt = \frac{y^2}{2} - \frac{y_0^2}{2}.$$

Nach (6.8), oder (6.7) durch Anwendung von G auf beide Seiten, folgt

$$\frac{y^2}{2} - \frac{y_0^2}{2} = \frac{x^2}{2} - \frac{x_0^2}{2}. \quad (6.9)$$

Durch Umstellen erhält man die Lösung

$$\begin{aligned} y &= \sqrt{x^2 - x_0^2 + y_0^2} \quad \text{falls } c > 0, \\ y &= -\sqrt{x^2 - x_0^2 + y_0^2} \quad \text{falls } d < 0. \end{aligned}$$

Die Wahl von x kann in Abhängigkeit von (x_0, y_0) eingeschränkt sein. Nach (6.9) kann man die Lösung auch in der Form

$$y^2 - x^2 = y_0^2 - x_0^2 =: c_0$$

schreiben. Dies ist eine Hyperbel. Sei $c_0 > 0$, dann hat man für $c > 0$ einen oberen Ast, siehe Abbildung 6.4, und für $d < 0$ einen unteren Ast.

Für $c_0 < 0$ besteht die Lösung aus je einem Teil des linken beziehungsweise des rechten Astes einer Hyperbel. Im Fall $c_0 = 0$ ist die Lösung $y = |x|$ oder $y = -|x|$, jeweils mit $x \neq 0$. □

Bemerkung 6.14 *Methode der Trennung der Variablen.* Man braucht sich die Lösungsformel für das Anfangswertproblem (6.6) nicht zu merken, da es einen einfachen, wenngleich mathematisch nicht ganz exakten, Weg zur Berechnung der Lösung gibt – die Methode der Trennung der Variablen:

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= f(x)g(y) && \text{behandle linke Seite wie einen Bruch} \\ \frac{dy}{g(y)} &= f(x)dx && \text{integriere unbestimmt} \\ \int \frac{dy}{g(y)} &= \int f(x) \, dx && \text{finde Stammfunktionen} \\ G(y) &= F(x) + c && \text{fasse Integrationskonstanten zusammen} \\ y &= G^{-1}(F(x) + c) && \text{löse nach } y \text{ auf.} \end{aligned}$$

Die Konstante c wird zum Schluss aus der Anfangsbedingung bestimmt. □




Abbildung 6.4: Beispiel 6.13, oberer Hyperbelast, Lösung im Fall $c > 0$, $c_0 = 1$.

Beispiel 6.15 *Methode der Trennung der Variablen.* Betrachte die Methode der Trennung der Variablen in Beispiel 6.13. Man hat

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{x}{y} \implies \\ ydy &= xdx \implies \\ \int y \, dy &= \int x \, dx \implies \\ \frac{y^2}{2} &= \frac{x^2}{2} + c. \end{aligned}$$

Nun hat man zunächst die allgemeine Lösung der Differentialgleichung. Die Anfangsbedingung ergibt

$$\frac{y_0^2}{2} = \frac{x_0^2}{2} + c \implies c = \frac{1}{2} (y_0^2 - x_0^2).$$

□

Bemerkung 6.16 *Der Fall, dass $g(y)$ eine Nullstelle besitzt.* Sei $y_1 \in (c, d)$ mit $g(y_1) = 0$. Dann ist eine Lösung des AWP (6.6) mit der Anfangsbedingung $y(x_0) = y_1$ sofort durch $y(x) = y_1$ für alle $x \in (a, b)$ gegeben, da dann $g(y) = g(y_1) = 0$ und beide Seiten der Differentialgleichung von (6.6) gleich Null sind. Es kann jedoch passieren, dass es weitere Lösungen dieses AWP's gibt, siehe Übungsaufgaben. □

6.2.3 Lineare Differentialgleichungen

Definition 6.17 **Lineare Differentialgleichung 1. Ordnung.** Eine gewöhnliche Differentialgleichung der Gestalt

$$y'(x) + f(x)y(x) = g(x), \tag{6.10}$$

wobei $f(x), g(x)$ definiert und stetig in $(a, b) \subset \mathbb{R}$ sind, heißt lineare Differentialgleichung 1. Ordnung. Für $g(x) \equiv 0$ spricht man von einer homogenen linearen Differentialgleichung 1. Ordnung. □

Bemerkung 6.18 *Zu linearen Differentialgleichungen.*

- Die gewöhnliche Differentialgleichung heißt linear, weil $y'(x)$ und $y(x)$ nur linear auftreten.

- Die homogene lineare Differentialgleichung 1. Ordnung ist eine spezielle Differentialgleichung mit getrennten Variablen.
- Man sieht sofort, dass $y(x) \equiv 0$ eine Lösung der homogenen linearen Differentialgleichung 1. Ordnung ist.

□

Satz 6.19 Superpositionsprinzip.

- i) Sind $y_1(x)$ und $y_2(x)$ zwei Lösungen der homogenen linearen Differentialgleichung 1. Ordnung, so ist auch jede Linearkombination $c_1y_1(x) + c_2y_2(x)$ mit beliebigen Konstanten $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ eine Lösung der homogenen linearen Differentialgleichung 1. Ordnung.
- ii) Sind $y_i(x)$ eine Lösung der inhomogenen linearen Differentialgleichung 1. Ordnung und $y_h(x)$ eine Lösung der homogenen linearen Differentialgleichung 1. Ordnung, dann ist $y_i(x) + y_h(x)$ eine Lösung der inhomogenen linearen Differentialgleichung 1. Ordnung.
- iii) Sind $y_i(x)$ und $\tilde{y}_i(x)$ zwei Lösungen der inhomogenen linearen Differentialgleichung 1. Ordnung, so ist ihre Differenz Lösung der homogenen linearen Differentialgleichung 1. Ordnung.

Beweis: Alle Aussagen beweist man durch direktes Nachrechnen.

i) Es gilt für beliebige $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} & (c_1y_1(x) + c_2y_2(x))' + f(x)(c_1y_1(x) + c_2y_2(x)) \\ &= c_1y_1'(x) + c_2y_2'(x) + f(x)(c_1y_1(x) + c_2y_2(x)) \\ &= c_1 \underbrace{(y_1'(x) + f(x)y_1(x))}_{=0} + c_2 \underbrace{(y_2'(x) + f(x)y_2(x))}_{=0} = 0, \end{aligned}$$

da $y_1(x), y_2(x)$ nach Voraussetzung Lösungen der homogenen Differentialgleichung sind. Man nutzt im Beweis die Linearität der Differentiation und die Linearität der Differentialgleichung.

ii), iii) Übungsaufgaben. ■

Satz 6.20 Allgemeine Lösung der inhomogenen linearen Differentialgleichung 1. Ordnung. Man erhält alle Lösungen der inhomogenen linearen Differentialgleichung 1. Ordnung, indem man zu einer speziellen Lösung der inhomogenen linearen Differentialgleichung $y_i(x)$ alle Lösungen der homogenen linearen Differentialgleichung $\{y_h(x)\}$ addiert.

Beweis: Jede Funktion $y_i(x) + \tilde{y}_h(x)$ mit $\tilde{y}_h(x) \in \{y_h(x)\}$ ist nach dem Superpositionsprinzip ii) Lösung der inhomogenen linearen Differentialgleichung 1. Ordnung. Also ist $y_i(x) + \{y_h(x)\}$ eine Teilmenge der Gesamtheit aller Lösungen.

Sei $\tilde{y}_i(x)$ eine beliebige andere Lösung der inhomogenen linearen Differentialgleichung. Nach Superpositionsprinzip iii) ist dann $\tilde{y}_i(x) - y_i(x)$ eine Lösung der homogenen linearen Differentialgleichung. Also gibt es ein $\tilde{y}_h(x) \in \{y_h(x)\}$ mit

$$\tilde{y}_i(x) - y_i(x) = \tilde{y}_h(x) \iff \tilde{y}_i(x) = y_i(x) + \tilde{y}_h(x).$$

Demzufolge lässt sich jede Lösung der inhomogenen linearen Differentialgleichung in der oben angegebenen Form darstellen. ■

$$\begin{aligned} & \text{allgemeine Lösung der inhomogenen linearen Differentialgleichung} \\ &= \text{spezielle Lösung der inhomogenen linearen Differentialgleichung} \\ &+ \text{allgemeine Lösung der homogenen linearen Differentialgleichung} \end{aligned}$$

Satz 6.21 Existenz und Darstellung der allgemeinen Lösung der homogenen linearen Differentialgleichung 1. Ordnung. Sei $f(x)$ in (a, b) stetig. Es gibt eine Funktion $y_h(x)$ mit $D(y_h) = (a, b)$, $y_h \in C^1(a, b)$, $y_h(x) \neq 0$ für alle $x \in (a, b)$, so dass

$$\{cy_h(x) : c \in \mathbb{R}\}$$

die Gesamtheit aller Lösungen der homogenen linearen Differentialgleichung 1. Ordnung ist. Das ist ein eindimensionaler Unterraum von $C^1(a, b)$. Es gilt

$$y_h(x) = \exp\left(-\int_{x_0}^x f(t) dt\right)$$

mit $x_0 \in (a, b)$ beliebig.

Beweis: Für Interessenten.

Betrachte die homogene lineare Differentialgleichung

$$y_h'(x) + f(x)y_h(x) = 0 \iff y_h'(x) = -f(x)y_h(x).$$

Das ist eine Differentialgleichung mit getrennten Variablen. Betrachte o.B.d.A. den Fall $y_h(x) > 0$ für alle $x \in (a, b)$. Dann hat die Differentialgleichung die Lösung

$$y_h(x) = \exp\left(-\int_{x_0}^x f(t) dt\right)$$

mit $x_0 \in (a, b)$, denn man erhält mit der Kettenregel und der Differentiation nach der oberen Integrationsgrenze

$$y_h'(x) = \exp\left(-\int_{x_0}^x f(t) dt\right) (-f(x)) = -f(x)y_h(x).$$

Zur Erinnerung: Differentiation nach der oberen Integrationsgrenze, wobei $F(x)$ eine Stammfunktion von $f(x)$ ist:

$$\frac{d}{dx} \int_{x_0}^x f(t) dt = \frac{d}{dx} (F(x) - F(x_0)) = F'(x) = f(x),$$

mit dem Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung.

Da $f(x)$ stetig ist, ist $y_h(x)$ differenzierbar. Außerdem gilt wegen der Exponentialfunktion $y_h(x) > 0$ für alle $x \in (a, b)$. Nach dem Superpositionsprinzip ist $\{cy_h(x)\}$ mit $c \in \mathbb{R}$ Lösung der homogenen linearen Differentialgleichung.

Es bleibt zu zeigen, dass es neben $\{cy_h(x) : c \in \mathbb{R}\}$ keine anderen Lösungen gibt. Sei $\tilde{y}_h \in C^1(a, b)$ eine beliebige Lösung der homogenen linearen Differentialgleichung 1. Ordnung. Man setzt

$$\tilde{y}_h(x) = w(x)y_h(x) \implies w(x) = \frac{\tilde{y}_h(x)}{y_h(x)}, \quad y_h(x) \neq 0.$$

Da $\tilde{y}_h, y_h \in C^1(a, b)$ und $y_h(x) \neq 0$ folgt $w \in C^1(a, b)$. Es ist

$$\begin{aligned} w'(x) &= \frac{\tilde{y}_h'(x)y_h(x) - \tilde{y}_h(x)y_h'(x)}{(y_h(x))^2} \\ \text{Dgl. einsetzen} & \quad \underline{\underline{\quad -f(x)\tilde{y}_h(x)y_h(x) + \tilde{y}_h(x)f(x)y_h(x) \quad}} = 0. \\ & \quad \underline{\underline{\quad (y_h(x))^2 \quad}} \end{aligned}$$

Damit ist $w(x)$ eine Konstante und $\tilde{y}_h(x) = cy_h(x)$. Es gibt also keine weiteren Lösungen als $\{cy_h(x) : c \in \mathbb{R}\}$. ■

Satz 6.22 Existenz einer Lösung der inhomogenen linearen Differentialgleichung 1. Ordnung. Seien $f(x), g(x)$ in (a, b) stetig. Dann gibt es eine Lösung $y_i(x)$ der inhomogenen linearen Differentialgleichung 1. Ordnung mit $D(y_i) = (a, b)$, $y_i \in C^1(a, b)$, so dass $\{y_i(x) + cy_h(x) : c \in \mathbb{R}\}$ die Gesamtheit aller Lösungen der inhomogenen linearen Differentialgleichung 1. Ordnung ist (affine Mannigfaltigkeit mit Trägerpunkt $y_i(x)$).

Beweis: Nutze den Ansatz

$$y_i(x) = c(x)y_h(x),$$

wobei $y_h(x)$ die im Beweis von Satz 6.21 konstruierte Lösung der homogenen linearen Differentialgleichung 1. Ordnung ist. Dieser Ansatz wird Variation der Konstanten genannt. Man versucht, eine stetig differenzierbare Funktion $c(x)$ so zu bestimmen, dass $y_i(x)$ eine Lösung der inhomogenen linearen Differentialgleichung 1. Ordnung ist. Einsetzen des Ansatzes in die Differentialgleichung liefert

$$\begin{aligned} c'(x)y_h(x) + c(x)y_h'(x) + f(x)c(x)y_h(x) &= g(x) \iff \\ c'(x)y_h(x) + c(x)\underbrace{(y_h'(x) + f(x)y_h(x))}_{=0} &= g(x). \end{aligned}$$

Damit genügt $c(x)$ der Differentialgleichung mit getrennten Variablen

$$c'(x) = \frac{g(x)}{y_h(x)} \implies c(x) = \int_{x_0}^x \frac{g(t)}{y_h(t)} dt, \quad x_0 \in (a, b).$$

Rücksubstitution liefert

$$y_i(x) = \left(\int_{x_0}^x \frac{g(t)}{y_h(t)} dt \right) y_h(x).$$

Diese Funktion ist stetig differenzierbar, da beide Faktoren stetig differenzierbar sind. Nach Konstruktion löst $y_i(x)$ die inhomogene lineare Differentialgleichung 1. Ordnung. Nach dem Superpositionsprinzip und Satz 6.21 ist $\{y_i(x) + cy_h(x) : c \in \mathbb{R}\}$ die Gesamtheit aller Lösungen der inhomogenen linearen Differentialgleichung 1. Ordnung. ■

Satz 6.23 Eindeutige Lösbarkeit des Anfangswertproblems. Seien $f(x), g(x)$ in (a, b) stetig. Dann besitzt das Anfangswertproblem

$$y'(x) + f(x)y(x) = g(x), \quad y(x_0) = y_0, \quad x_0 \in (a, b),$$

mit beliebigem $y_0 \in \mathbb{R}$ eine eindeutige Lösung.

Beweis: Seien $x_0 \in (a, b)$ und $y_0 \in \mathbb{R}$ gegeben. Einsetzen der Anfangsbedingung in die im Satz 6.22 angegebene allgemeine Lösung ergibt

$$y_i(x_0) + cy_h(x_0) = y(x_0) = y_0.$$

Mit Hilfe der in den Beweisen von Satz 6.21 und 6.22 konstruierten Darstellung der allgemeinen Lösung folgt

$$0 + c \cdot 1 = y_0 \implies c = y_0.$$

Damit ist die Konstante eindeutig bestimmt. ■

Bemerkung 6.24 Fazit.

- Die homogene lineare Differentialgleichung 1. Ordnung wird mit Trennung der Veränderlichen gelöst.
- Eine spezielle Lösung der inhomogenen linearen Differentialgleichung 1. Ordnung findet man mit der Methode der Variation der Konstanten.
- Ob man die allgemeine Lösung explizit angeben kann, hängt „lediglich“ davon ab, ob man die auftretenden Integrale explizit berechnen kann.

- Ein Anfangswertproblem löst man, indem man zuerst die allgemeine Lösung berechnet und dann in diese die Anfangsbedingung einsetzt.
- Besitzen die Koeffizientenfunktionen $f(x)$ und $g(x)$ in (6.10) eine „günstige“ Gestalt, so kann man eine spezielle Lösung der inhomogenen Differentialgleichung auch mit einem geeigneten Ansatz gewinnen. Sind $f(x)$ und $g(x)$ beispielsweise Polynome, so setzt man auch $y_i(x)$ als Polynom mit geeignetem Grad an. Diese Herangehensweise nennt man Störgliedansätze, siehe Übungsaufgaben.

□

Beispiel 6.25 *Lösung eines linearen Anfangswertproblems 1. Ordnung.* Gesucht ist die Lösung des Anfangswertproblems

$$y'(x) + y(x) = \cos(x), \quad y(0) = 4711.$$

i) *allgemeine Lösung der homogenen Differentialgleichung.*

$$\begin{aligned} y_h' + y_h &= 0 \implies \\ \int \frac{dy}{y_h} &= - \int dx \implies \\ \ln |y_h| &= -x + c_0 \implies \\ y_h(x) &= ce^{-x}, \quad c \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

ii) *spezielle Lösung der inhomogenen Differentialgleichung mit Variation der Konstanten.* Der Ansatz ist

$$y_i(x) = c(x)e^{-x}.$$

Einsetzen in die Differentialgleichung ergibt

$$\begin{aligned} c'(x)e^{-x} + \underbrace{c(x)(-e^{-x}) + c(x)e^{-x}}_{=0} &= \cos(x) \implies \\ c'(x) &= e^x \cos(x) \implies \\ c(x) &= \int_0^x e^t \cos(t) dt \implies \\ c(x) &= \frac{1}{2}e^x (\cos(x) + \sin(x)) - \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Einsetzen in den Ansatz ergibt

$$y_i(x) = c(x)y_h(x) = \frac{1}{2}(\cos(x) + \sin(x)) - \frac{1}{2}e^{-x}.$$

Der zweite Term gehört zur allgemeinen Lösung der homogenen Differentialgleichung. Damit erhält man als allgemeine Lösung der inhomogenen Differentialgleichung

$$y_{\text{allg}}(x) = \frac{1}{2}(\cos(x) + \sin(x)) + c_0e^{-x}, \quad c_0 \in \mathbb{R}.$$

Wichtig: Wenn Zeit ist, die allgemeine Lösung durch Einsetzen in die Differentialgleichung kontrollieren.

iii) *Anfangsbedingung.* Einsetzen in die allgemeine Lösung der inhomogenen Differentialgleichung ergibt

$$y_{\text{allg}}(0) = \frac{1}{2} + c_0 = 4711 \implies c_0 = 4710.5.$$

Damit lautet die Lösung des Anfangswertproblems

$$y(x) = \frac{1}{2}(\cos(x) + \sin(x)) + 4710.5e^{-x}.$$

Wichtig: Nicht die fertigen Formeln merken, sondern den Weg!!!

□

6.2.4 Die Bernoullische Differentialgleichung

Definition 6.26 Bernoulli¹sche Differentialgleichung. Eine gewöhnliche Differentialgleichung der Gestalt

$$y'(x) = f_0(x)y^\alpha(x) + f_1(x)y(x) \quad (6.11)$$

mit $f_0, f_1 \in C([a, b])$, $\alpha \in \mathbb{R}$, $\alpha \neq 1$, $f_0(x) \not\equiv 0$ heißt Bernoullische Differentialgleichung. \square

Satz 6.27 Transformation der Bernoullischen Differentialgleichung in eine lineare Differentialgleichung 1. Ordnung. Ist $y(x)$ eine Lösung der Bernoullischen Differentialgleichung (6.11) mit $y(x) > 0$ für alle $x \in (a, b)$, so genügt

$$z(x) = y^{1-\alpha}(x)$$

der linearen Differentialgleichung 1. Ordnung

$$z'(x) = (1 - \alpha)(f_0(x) + f_1(x)z(x)). \quad (6.12)$$

Umgekehrt erhält man aus jeder Lösung $z(x)$ von (6.12) mit $z(x) > 0$ für alle $x \in (a, b)$ durch

$$y(x) = z^{1/(1-\alpha)}(x)$$

eine Lösung von (6.11).

Das Anfangswertproblem zu (6.11) mit $y(x_0) = y_0$, $x_0 \in (a, b)$, ist eindeutig lösbar, falls $y_0 > 0$ ist.

Beweis: Für Interessenten.

Aus (6.11) folgt durch Division mit $y^\alpha(x) > 0$

$$\begin{aligned} (1 - \alpha)y^{-\alpha}(x)y'(x) &= \left(f_0(x) + f_1(x)y^{1-\alpha}(x)\right)(1 - \alpha) \iff \\ \left(y^{1-\alpha}\right)'(x) &= \left(f_0(x) + f_1(x)y^{1-\alpha}(x)\right)(1 - \alpha). \end{aligned}$$

Setze $z(x) = y^{1-\alpha}(x) > 0$. Daraus folgt mit (6.11)

$$z'(x) = (1 - \alpha)y^{-\alpha}(x)y'(x) = (1 - \alpha)\left(f_0(x) + f_1(x)y^{1-\alpha}(x)\right) = (1 - \alpha)(f_0(x) + f_1(x)z(x)).$$

Das ist eine lineare Differentialgleichung 1. Ordnung. Da alle Umformungen äquivalent waren folgt, dass falls $y(x)$ (6.11) löst, so löst $z(x)$ auch (6.12) und umgekehrt.

Das Anfangswertproblem zu (6.12) mit $z(x_0) = z_0 \in \mathbb{R}^+$ beliebig (da $z(x) > 0$) ist nach Satz 6.23 eindeutig lösbar. Damit ist auch das Anfangswertproblem zu (6.11) mit $y_0 = y(x_0) = z_0^{1/(1-\alpha)} > 0$ eindeutig lösbar. Die Abbildung $\mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$, $z_0 \mapsto y_0$ ist bijektiv für $\alpha > 0$, $\alpha \neq 1$. Damit hat das Anfangswertproblem zu (6.11) für jedes $y_0 > 0$ eine eindeutige Lösung. \blacksquare

Beispiel 6.28 Lösung einer Bernoullischen Differentialgleichung. Gesucht ist die Lösung von

$$y'(x) + 2xy(x) = 2x^3y^3(x), \quad y(0) = 2.$$

Der Ansatz lautet

$$z(x) = y^{-2}(x) = \frac{1}{y^2(x)} \implies z'(x) = -2y^{-3}(x)y'(x).$$

¹Jakob Bernoulli (1654 – 1705)

Einsetzen in die Differentialgleichung liefert

$$\begin{aligned}\frac{y'(x)}{y^3(x)} + 2\frac{x}{y^2(x)} &= 2x^3 \implies \\ -\frac{z'(x)}{2} + 2xz(x) &= 2x^3 \implies \\ z'(x) &= 4xz(x) - 4x^3.\end{aligned}$$

Das ist eine lineare Differentialgleichung 1. Ordnung.

Für die homogene Gleichung erhält man

$$z'_h(x) = 4xz_h(x) \implies z_h(x) = ce^{2x^2}, \quad c \in \mathbb{R}.$$

Eine spezielle Lösung der inhomogenen Gleichung kann man mit Variation der Konstanten finden. Der Ansatz ist

$$z_i(x) = c(x)e^{2x^2}.$$

Einsetzen in Differentialgleichung liefert

$$c'(x)e^{2x^2} = -4x^3 \implies c'(x) = -4x^3 e^{-2x^2}.$$

Zweimalige partielle Integration ergibt

$$c(x) = e^{-2x^2} \left(\frac{1}{2} + x^2 \right).$$

Einsetzen in den Ansatz liefert

$$z_i(x) = \frac{1}{2} + x^2 \implies z(x) = \left(\frac{1}{2} + x^2 \right) + ce^{2x^2}, \quad c \in \mathbb{R}.$$

In diesem Beispiel hätte auch ein Störgliedansatz mit einem quadratischen Polynom schnell zum Ziel geführt.

Für die Lösung des Anfangswertproblems der Bernoullischen Differentialgleichung benötigt man nur die Lösung mit $z(x) > 0$ in einer Umgebung von $x = 0$. Durch Rücksubstitution erhält man

$$y(x) = z^{-1/2}(x) = \left(\frac{1}{2} + x^2 + ce^{2x^2} \right)^{-1/2} > 0.$$

Einsetzen der Anfangsbedingung ergibt

$$y(0) = \left(\frac{1}{2} + c \right)^{-1/2} = 2 \implies 1 = 4 \left(\frac{1}{2} + c \right) \implies c = -\frac{1}{4}.$$

Die Lösung des Anfangswertproblems ist

$$y(x) = \left(\frac{1}{2} + x^2 - \frac{1}{4}e^{2x^2} \right)^{-1/2},$$

siehe Abbildung 6.5.

Man beachte:

- Der Definitionsbereich von $y(x)$ ist beschränkt.
- Für $y_0 < 0$ ist das Anfangswertproblem nicht lösbar.
- *Wichtig: Substitution $z(x) = y^{1-\alpha}(x)$ merken !!!*

□




Abbildung 6.5: Lösung des Anfangswertproblems aus Beispiel 6.28.

6.2.5 Die Riccati'sche Differentialgleichung

Definition 6.29 Riccati'sche Differentialgleichung. Eine gewöhnliche Differentialgleichung der Gestalt

$$y'(x) = f_0(x)y^2(x) + 2f_1(x)y(x) + f_2(x) \quad (6.13)$$

mit $f_i \in C(a, b)$, $i \in \{0, 1, 2\}$, $f_0(x) \neq 0$, heißt Riccati'sche Differentialgleichung. \square

Bemerkung 6.30 Spezialfälle. Spezialfälle von (6.13) sind

- $f_0(x) \equiv 0$, lineare Differentialgleichung,
- $f_2(x) \equiv 0$, Bernoulli'sche Differentialgleichung.

\square

Bemerkung 6.31 Normalform. Seien $f_1 \in C^1(a, b)$, $f_0 \in C^2(a, b)$ sowie $f_0(x) \neq 0$ in (a, b) . Dann kann man die Riccati'sche Differentialgleichung mittels der Transformation

$$z(x) = f_0(x)y(x) + \frac{1}{2f_0(x)} (f_0'(x) + 2f_1(x)f_0(x))$$

in die sogenannte Normalform

$$z'(x) = z^2(x) - f(x) \quad (6.14)$$

mit

$$f(x) = \left(-f_0f_2 + f_1^2 - f_1' + \frac{1}{4f_0^2} [4f_0f_0'f_1 + 3(f_0')^2 - 2f_0f_0''] \right) (x)$$

überführen (*Übungsaufgabe*). Eine Funktion $y(x)$ ist genau dann Lösung von (6.13) wenn $z(x)$ Lösung von (6.14) ist. \square

Bemerkung 6.32 Lösbarkeit. Die Riccati'sche Differentialgleichung ist im Allgemeinen nicht durch elementare Rechenoperationen und Aufsuchen von Stammfunktionen lösbar. Dies ist nur in folgenden Spezialfällen von (6.14) möglich:

- $f(x) = c \in \mathbb{R}$ für alle $x \in (a, b) \implies$ Trennung der Veränderlichen,
- $f(x) = c/x^2$, $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Dann führt die Transformation $u(x) = 1/z(x)$ zu

$$u'(x) = -1 + c \left(\frac{u(x)}{x} \right)^2.$$

Das ist eine sogenannte homogene Differentialgleichung, siehe Anhang C.1.

²Jacobo Francesco Riccati (1676 – 1754)

- Der wichtigste Fall ist der Folgende. Ist eine Lösung $z_0(x)$ von (6.14) bekannt, dann können alle weiteren Lösungen durch elementare Rechenoperationen und Aufsuchen der Stammfunktion bestimmt werden. Die allgemeine Lösung lautet

$$z(x) = z_0(x) + \frac{1}{u_0(x) + cu_1(x)}, \quad c \in \mathbb{R},$$

wobei $u_0(x)$ eine spezielle Lösung einer inhomogenen linearen Differentialgleichung ist und $u_1(x)$ Lösung einer homogenen linearen Differentialgleichung. \square

Satz 6.33 Eindeutigkeit der Lösung des Anfangswertproblems. *Seien die Voraussetzungen von Bemerkung 6.31 erfüllt. In jedem Intervall $(\alpha, \beta) \subset (a, b)$ existiert höchstens eine Lösung des Anfangswertproblems der Riccatischen Differentialgleichung (6.14) mit der Anfangsbedingung $z(x_0) = z_0$, $x_0 \in (\alpha, \beta)$.*

Beweis: Seien $z_1, z_2 \in C^1(\alpha, \beta)$ zwei Lösungen des Anfangswertproblems. Dann erfüllt die Differenz $y(x) = z_1(x) - z_2(x)$ das Anfangswertproblem

$$\begin{aligned} y'(x) &= z_1'(x) - z_2'(x) = z_1^2(x) - f(x) - (z_2^2(x) - f(x)) = z_1^2(x) - z_2^2(x) \\ &= (z_1(x) - z_2(x))(z_1(x) + z_2(x)) =: y(x)\tilde{f}(x) \end{aligned}$$

mit $\tilde{f}(x) := z_1(x) + z_2(x)$ und $y(x_0) = 0$. Man kann sich $\tilde{f}(x)$ als gegebene Funktion denken. Für jede stetige Funktion $\tilde{f}(x)$ erfüllt $y(x)$ das Anfangswertproblem einer linearen Differentialgleichung, welches gemäß Satz 6.23 eindeutig lösbar ist. Die Lösung lautet $y(x) \equiv 0$. \blacksquare

Bemerkung 6.34 Existenz einer Lösung. Die Existenz einer Lösung wird später, Folgerung 6.64, bewiesen. \square

Satz 6.35 Konstruktion aller Lösungen mit einer bekannten Lösung. *Sei $z_0 \in C^1(a, b)$ eine Lösung der Riccatischen Differentialgleichung (6.14) mit $f \in C(a, b)$. Die Funktion $y \in C^1(\alpha, \beta)$, $(\alpha, \beta) \subset (a, b)$, ist genau dann eine von $z_0(x)$ verschiedene Lösung von (6.14), das heißt $y(x) \neq z_0(x)$ in (α, β) , wenn*

$$u(x) = \frac{1}{y(x) - z_0(x)}$$

in (α, β) eine nicht verschwindende Lösung, das heißt $u(x) \neq 0$ für alle $x \in (\alpha, \beta)$, der linearen Differentialgleichung

$$u'(x) + 2z_0(x)u(x) + 1 = 0 \tag{6.15}$$

ist.

Beweis: Für Interessenten. Verwende den Ansatz

$$z_0(x) = y(x) - \frac{1}{u(x)} \implies z_0'(x) = y'(x) + \frac{u'(x)}{u^2(x)}.$$

Dieser Ansatz ist wohldefiniert, da $u(x) \neq 0$ in (α, β) . Einsetzen in (6.14) ergibt

$$\begin{aligned} y'(x) + \frac{u'(x)}{u^2(x)} &= y^2(x) - \frac{2y(x)}{u(x)} + \frac{1}{u^2(x)} - f(x) \implies \\ y'(x) - y^2(x) + f(x) &= \frac{1}{u^2(x)} (1 - 2y(x)u(x) - u'(x)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{u^2(x)} \left(1 - 2z_0(x)u(x) - 2\frac{u(x)}{u(x)} - u'(x) \right) \\
&= -\frac{1}{u^2(x)} (1 + 2z_0(x)u(x) + u'(x)). \quad (6.16)
\end{aligned}$$

i) Ist $y(x)$ die Lösung von (6.14), so ist die linke Seite von (6.16) gleich Null und $u(x)$ erfüllt die Differentialgleichung (6.15), da $1/u^2(x) > 0$.

ii) Genügt andererseits $u(x)$ der Gleichung (6.15) und ist $u(x) \neq 0$ in (α, β) , so erfüllt $y(x)$ (6.14) und es gilt $y(x) \neq z_0(x)$ in (α, β) , da

$$y(x) = z_0(x) + \frac{1}{u(x)}.$$

Da $1/u(x) \neq 0$ ist, gilt $y(x) \neq z_0(x)$ für alle $x \in (\alpha, \beta)$. ■

Bemerkung 6.36 Bestimmung aller Lösungen von (6.14). Die Bestimmung aller Lösungen von (6.14), im Falle dass eine Lösung bekannt ist, erfolgt wie der Beweis der beiden letzten Sätze, siehe auch das folgende Beispiel. Sei $z_0(x)$ eine bekannte Lösung von (6.14).

- Sei $z_1(x)$ eine andere Lösung von (6.14), dann erfüllt die Differenz $y(x) = z_1(x) - z_0(x)$ die Differentialgleichung

$$y'(x) = y^2(x) + 2z_0(x)y(x).$$

Das ist eine Bernoullische Differentialgleichung, deren allgemeine Lösung man bestimmen kann.

- Oder man verwendet den Ansatz vom Beweis von Satz 6.35:

$$y(x) = z_0(x) + \frac{1}{u(x)}$$

und berechnet $u(x)$ durch Lösen von (6.15). □

Beispiel 6.37 Lösung einer Riccatischen Differentialgleichung. Gesucht ist die Lösung von

$$y'(x) = y^2(x) - (2x + 1)y(x) + (1 + x + x^2),$$

vgl. (Kamke, 1945, S. 43).

i) Finden einer speziellen Lösung. Das ist der schwierigste Teil, im Allgemeinen hilft nur scharfes Hinsehen und Probieren. In diesem Beispiel ist $z_0(x) = x$ eine Lösung.

ii) Ansatz. Mit dem Ansatz

$$y(x) = z_0(x) + \frac{1}{u(x)} \quad \Longrightarrow \quad y'(x) = 1 - \frac{u'(x)}{u^2(x)}.$$

gelangt man hier auch ohne Überführung in die Normalform zu einer linearen Differentialgleichung. Einsetzen in die Differentialgleichung für $y(x)$ ergibt

$$u'(x) = u(x) - 1.$$

iii) Lösen der linearen Differentialgleichung. Nur Lösungen ohne Nullstelle sind von Interesse:

$$u(x) = 1 + ce^x, \quad c > 0.$$

iv) Rücksubstitution.

$$y(x) = z_0(x) + \frac{1}{u(x)} = x + \frac{1}{1 + ce^x}, \quad c > 0.$$

Das ist die allgemeine Lösung der Riccatischen Differentialgleichung. □

6.3 Allgemeine Existenz- und Eindeutigkeitsätze

6.3.1 Allgemeines

Bemerkung 6.38 *Inhalt.* Man hat bei den Spezialfällen von gewöhnlichen Differentialgleichungen 1. Ordnung aus Abschnitt 6.2 gesehen, dass es immer schwieriger wurde, analytische Lösungen anzugeben. Bei einer allgemeinen Differentialgleichung erster Ordnung wird das nicht mehr möglich sein. Trotzdem kann man auch im allgemeinen Fall Existenz und Eindeutigkeit von Lösungen von zugehörigen Anfangswertproblemen untersuchen.

In diesem Abschnitt werden zwei grundlegende Sätze behandelt:

- Satz von Picard-Lindelöf (sukzessive Approximation):
 - beruht auf dem Banachschen Fixpunktsatz,
 - Voraussetzung: Stetigkeit und partielle Lipschitz-Bedingung der rechten Seite,
 - Ergebnis: Existenz und Eindeutigkeit.
- Satz von Peano (Polygonzüge):
 - Voraussetzung: Stetigkeit der rechten Seite,
 - Ergebnis: Existenz.

□

Bemerkung 6.39 *Explizite Systeme gewöhnlicher Differentialgleichungen 1. Ordnung.* In diesem Kapitel werden explizite Systeme gewöhnlicher Differentialgleichungen 1. Ordnung betrachtet, da Untersuchungen für Systeme nicht anders sind als für eine einzelne Gleichung. Seien $y_i : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f_i : D(f_i) = D \rightarrow \mathbb{R}$ mit $D \subset \mathbb{R}^{n+1}$, $i = 1, \dots, n$. Dann werden die Vektoren

$$\mathbf{y}(x) = \begin{pmatrix} y_1(x) \\ y_2(x) \\ \vdots \\ y_n(x) \end{pmatrix}, \quad \mathbf{f}(x, \mathbf{y}) = \begin{pmatrix} f_1(x, y_1, \dots, y_n) \\ f_2(x, y_1, \dots, y_n) \\ \vdots \\ f_n(x, y_1, \dots, y_n) \end{pmatrix}$$

definiert. Die betrachteten Systeme haben dann die Form

$$\mathbf{y}'(x) = \mathbf{f}(x, \mathbf{y}) \quad \text{oder} \quad y_i'(x) = f_i(x, y_1, \dots, y_n), \quad i = 1, \dots, n. \quad (6.17)$$

Das zugehörige Anfangswertproblem lautet wie folgt. Gegeben seien $n + 1$ reelle Zahlen $x^{(0)}, y_1^0, \dots, y_n^0$ mit $(x^{(0)}, y_1^0, \dots, y_n^0) \in D$. Gesucht ist eine Lösung von (6.17) mit $y_i(x^{(0)}) = y_i^0$, $i = 1, \dots, n$. □

Bemerkung 6.40 *Umformung eines Anfangswertproblems in eine äquivalente Integralgleichung.* Sei $\mathbf{y}(x)$ eine Lösung des Anfangswertproblems

$$\mathbf{y}'(x) = \mathbf{f}(x, \mathbf{y}), \quad \mathbf{y}(x^{(0)}) = \mathbf{y}^{(0)}, \quad x \in I = [a, b], \quad x^{(0)} \in I,$$

wobei $\mathbf{f}(x, \mathbf{y})$ stetig ist. Wegen der Stetigkeit beider Seiten der Differentialgleichung kann man diese integrieren und man erhält

$$\begin{aligned} \int_{x^{(0)}}^x \mathbf{y}'(t) dt &= \int_{x^{(0)}}^x \mathbf{f}(t, \mathbf{y}(t)) dt \implies \\ \mathbf{y}(x) &= \mathbf{y}(x^{(0)}) + \int_{x^{(0)}}^x \mathbf{f}(t, \mathbf{y}(t)) dt. \end{aligned} \quad (6.18)$$

Dies ist eine Integralgleichung. Jede Lösung des Anfangswertproblems ist Lösung der Integralgleichung und umgekehrt. □

6.3.2 Der Satz von Picard-Lindelöf

Definition 6.41 Lipschitz³-Bedingung, Lipschitz-Konstante, Lipschitz-Stetigkeit. Eine Funktion $f(x)$ mit $D(f) = I$ genügt im Intervall $I \subset \mathbb{R}$ einer Lipschitz-Bedingung, falls für alle $x_1, x_2 \in I$

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq L|x_1 - x_2|$$

mit einer Konstanten $L \geq 0$ gilt. Diese Konstante wird Lipschitz-Konstante genannt und die Funktion $f(x)$ Lipschitz-stetig. \square

Bemerkung 6.42 Zusammenhang mit anderen Stetigkeitsbegriffen. Eine Funktion $f(x)$, die in I einer Lipschitz-Bedingung genügt ist in I auch stetig, denn es gilt für alle $x_1, x_2 \in I$

$$\lim_{x_2 \rightarrow x_1} |f(x_1) - f(x_2)| \leq L \lim_{x_2 \rightarrow x_1} |x_1 - x_2| = 0.$$

Allgemein gelten folgende Zusammenhänge:

$$\begin{array}{ccc} f(x) \text{ stetig in } (a, b) & \Leftarrow & f(x) \text{ stetig in } [a, b] \\ \uparrow & & \Downarrow \\ f(x) \text{ gleichmäßig stetig in } (a, b) & \Leftarrow & f(x) \text{ gleichmäßig stetig in } [a, b] \\ \uparrow & & \uparrow \\ f(x) \text{ Lipschitz-stetig in } (a, b) & \Leftarrow & f(x) \text{ Lipschitz-stetig in } [a, b] \\ & & \uparrow \\ f(x) \text{ differenzierbar in } (a, b) & \Leftarrow & f(x) \text{ differenzierbar in } [a, b] \\ \downarrow & & \\ f(x) \text{ stetig in } (a, b) & & \end{array}$$

Einige dieser Beziehungen folgen direkt aus der Definition der Begriffe, andere muss man nachrechnen.

Insgesamt ist Lipschitz-Stetigkeit von $f(x)$ in einem abgeschlossenen Intervall etwas weniger als Differenzierbarkeit, aber mehr als Stetigkeit von $f(x)$. \square

Lemma 6.43 Lipschitz-Konstante für stetig differenzierbare Funktionen.

Die Funktion $f(x)$ sei in (a, b) stetig differenzierbar und die Funktion sowie die Ableitung $f'(x)$ seien stetig auf $[a, b]$ fortsetzbar, das heißt $f \in C^1([a, b])$. Dann erfüllt $f(x)$ in $[a, b]$ eine Lipschitz-Bedingung mit

$$L = \max_{x \in [a, b]} |f'(x)|.$$

Beweis: mit Mittelwertsatz der Differentialrechnung, Übungsaufgabe. \blacksquare

Definition 6.44 Lipschitz-Bedingung bezüglich von Variablen. Sei $\mathbf{f} : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ mit $D \subset \mathbb{R}^{n+1}$ wie im System (6.17). Dann erfüllt $\mathbf{f}(x, \mathbf{y})$ eine Lipschitz-Bedingung bezüglich der Variablen y_1, \dots, y_n , falls für alle (x, y_1, \dots, y_n) und $(x, \bar{y}_1, \dots, \bar{y}_n)$ gilt

$$\|\mathbf{f}(x, y_1, \dots, y_n) - \mathbf{f}(x, \bar{y}_1, \dots, \bar{y}_n)\|_\infty \leq L \|\mathbf{y} - \bar{\mathbf{y}}\|_\infty$$

mit $L \geq 0$. \square

Lemma 6.45 Lipschitz-Bedingung für stetig differenzierbare Funktionen.

Die Funktion $\mathbf{f}(x, \mathbf{y})$ sei stetig differenzierbar nach y_1, \dots, y_n im Quader

$$Q := \left\{ (x, \mathbf{y}) : \left| x - x^{(0)} \right| \leq a, \left| y_j - y_j^0 \right| \leq b, j = 1, \dots, n \right\}.$$

Dann erfüllt $\mathbf{f}(x, \mathbf{y})$ bezüglich y_1, \dots, y_n eine Lipschitz-Bedingung.

³Rudolf Lipschitz (1832 – 1903)

Beweis: Genauso wie von Lemma 6.43, Übungsaufgabe. ■

Definition 6.46 Kontrahierende oder kontraktive Abbildung. Seien (E, d) ein metrischer Raum, $A \subset E$ eine Teilmenge und $T : A \rightarrow E$ eine Abbildung. Die Abbildung wird kontrahierend oder kontraktiv genannt, falls es ein $\kappa \in [0, 1)$ gibt, so dass

$$d(T(x), T(y)) \leq \kappa d(x, y) \quad \text{für alle } x, y \in A$$

ist. Der Abstand der Bilder ist also kleiner als der Abstand der Urbilder. □

Satz 6.47 Fixpunktsatz von Banach⁴ (1920). Seien A eine nichtleere, abgeschlossene Teilmenge eines vollständigen metrischen Raumes (E, d) und $T : A \rightarrow A$ eine kontrahierende Abbildung von A in sich. Dann gibt es genau einen Fixpunkt $\hat{x} \in A$ mit $T(\hat{x}) = \hat{x}$. Dieser ist der Grenzwert der sukzessiven Approximation

$$x^{(n+1)} = T(x^{(n)}), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

mit beliebigem Startwert $x^{(0)} \in A$.

Beweis: Analysis-Vorlesung, Literatur. ■

Satz 6.48 Lokaler Existenz- und Eindeutigkeitsatz von Picard⁵-Lindelöf⁶. Betrachte das Anfangswertproblem

$$y'_j(x) = f_j(x, y_1, \dots, y_n), \quad y_j(x^{(0)}) = y_j^0, \quad j = 1, \dots, n, \quad (6.19)$$

auf dem abgeschlossenen und beschränkten (kompakten) Quader

$$Q := \left\{ (x, \mathbf{y}) : |x - x^{(0)}| \leq a, |y_j - y_j^0| \leq b, j = 1, \dots, n \right\}, \quad a, b \in \mathbb{R}^+.$$

Die Funktion $\mathbf{f} : Q \rightarrow \mathbb{R}^n$ sei auf Q stetig und sie genüge einer Lipschitz-Bedingung bezüglich \mathbf{y} :

$$\begin{aligned} \|\mathbf{f}(x, \mathbf{y}) - \mathbf{f}(x, \bar{\mathbf{y}})\|_{[C(Q)]^n} &= \max_{1 \leq j \leq n} \max_{x \in [x^{(0)} - a, x^{(0)} + a]} |f_j(x, \mathbf{y}(x)) - f_j(x, \bar{\mathbf{y}}(x))| \\ &\leq L \max_{1 \leq j \leq n} \max_{x \in [x^{(0)} - a, x^{(0)} + a]} |y_j(x) - \bar{y}_j(x)| \\ &= L \|\mathbf{y} - \bar{\mathbf{y}}\|_{[C(\tilde{I})]^n}, \end{aligned} \quad (6.20)$$

für alle $(x, \mathbf{y}), (x, \bar{\mathbf{y}}) \in Q$ mit $L \in \mathbb{R}_0^+$, wobei $\tilde{I} = [x^{(0)} - a, x^{(0)} + a]$.

Dann gibt es eine Zahl $M > 0$, so dass gilt

$$|f_j(x, \mathbf{y})| \leq M \quad \text{für alle } (x, \mathbf{y}) \in Q, \quad j = 1, \dots, n. \quad (6.21)$$

Das Anfangswertproblem (6.19) besitzt auf dem Intervall

$$I := [x^{(0)} - a, x^{(0)} + a] \cap [x^{(0)} - c, x^{(0)} + c]$$

mit

$$c := \min \left\{ \frac{1}{\alpha L}, \frac{b}{M} \right\} \quad \text{mit } \alpha > 1 \text{ beliebig,} \quad (6.22)$$

⁴Stefan Banach (1892 – 1945)

⁵Emile Picard (1856 – 1941)

⁶Ernst Lindelöf (1870 – 1946)

genau eine Lösung $\mathbf{y} \in [C^1(I)]^n$.

Die sukzessive Approximation

$$\mathbf{y}^{(k+1)}(x) := \mathbf{y}^{(0)}(x) + \int_{x^{(0)}}^x \mathbf{f}(t, \mathbf{y}^{(k)}(t)) dt, \quad k = 0, 1, \dots, \quad \mathbf{y}^{(0)}(x) = \mathbf{y}^0, \quad (6.23)$$

konvergiert auf I gegen diese Lösung $\mathbf{y}(x)$.

Beweis: Die Beschränktheit von $\mathbf{f}(x, \mathbf{y})$ auf Q folgt nach dem Satz von Weierstraß aus der Stetigkeit von $\mathbf{f}(x, \mathbf{y})$ und der Abgeschlossenheit von Q .

Der Beweis der Existenz und der Eindeutigkeit der Lösung erfolgt durch Anwendung des Banachschen Fixpunktsatzes 6.47. Betrachte dazu die Abbildung

$$T : A \rightarrow A \subset [C(I)]^n, \quad T\mathbf{y}(x) := \mathbf{y}^0 + \int_{x^{(0)}}^x \mathbf{f}(t, \mathbf{y}(t)) dt, \quad x \in I, \quad \mathbf{y} \in [C(I)]^n, \quad (6.24)$$

wobei A im Beweis definiert wird. Offenbar gilt $T\mathbf{y}(x^{(0)}) = \mathbf{y}^0$. Nach Bemerkung 6.40 folgt, dass ein Fixpunkt dieser Abbildung eine Lösung von (6.19) ist.

Zunächst wird gezeigt, dass das Bild dieser Abbildung eine stetig differenzierbare Funktion ist. Seien $\hat{x}, \tilde{x} \in I$, dann gilt

$$\begin{aligned} & \|T\mathbf{y}(\hat{x}) - T\mathbf{y}(\tilde{x})\|_{[C(I)]^n} \\ &= \left\| \mathbf{y}^0 + \int_{x^{(0)}}^{\hat{x}} \mathbf{f}(t, \mathbf{y}(t)) dt - \mathbf{y}^0 - \int_{x^{(0)}}^{\tilde{x}} \mathbf{f}(t, \mathbf{y}(t)) dt \right\|_{[C(I)]^n} \\ &= \left\| \int_{\tilde{x}}^{\hat{x}} \mathbf{f}(t, \mathbf{y}(t)) dt \right\|_{[C(I)]^n} \leq \int_{\min\{\hat{x}, \tilde{x}\}}^{\max\{\hat{x}, \tilde{x}\}} \|\mathbf{f}(t, \mathbf{y}(t))\|_{[C(Q)]^n} dt \\ &= |\hat{x} - \tilde{x}| \|\mathbf{f}(x, \mathbf{y}(x))\|_{[C(Q)]^n} \leq M |\hat{x} - \tilde{x}|, \end{aligned}$$

woraus $T\mathbf{y}(\hat{x}) \rightarrow T\mathbf{y}(\tilde{x})$ für $\hat{x} \rightarrow \tilde{x}$ in der Norm $\|\cdot\|_{[C(I)]^n}$ folgt.

Wegen der Stetigkeit von $\mathbf{f}(x, \mathbf{y})$ ist das Integral in (6.24) als Funktion der oberen Grenze wohldefiniert und es gilt $(T\mathbf{y})'(x) = \mathbf{f}(x, \mathbf{y}(x))$ für alle $x \in I$. Damit ist die Funktion $T\mathbf{y}(x)$ auch differenzierbar.

Nun wird gezeigt, dass die Abbildung T die Voraussetzungen des Banachschen Fixpunktsatzes erfüllt.

Abgeschlossener Definitionsbereich von T . Betrachte die Menge

$$A := \left\{ \mathbf{y} \in [C(I)]^n : \|\mathbf{y}(x) - \mathbf{y}^0\|_{[C(I)]^n} \leq b \text{ für alle } x \in I \right\}.$$

Die Menge $A \neq \emptyset$ ist eine abgeschlossene Teilmenge des Banach-Raumes $[C(I)]^n$. Dass A eine Teilmenge von $[C(I)]^n$ ist folgt aus der Definition von A . Die Abgeschlossenheit erhält man wie folgt. Sei $\{\mathbf{y}^{(k)}(x)\}_{k \in \mathbb{N}}$, $\mathbf{y}^{(k)} \in A$, eine konvergente Folge mit Grenzwert $\mathbf{y} \in [C(I)]^n$, das heißt es gilt

$$0 = \lim_{k \rightarrow \infty} \|\mathbf{y}^{(k)}(x) - \mathbf{y}(x)\|_{[C(I)]^n}.$$

Mit Dreiecksungleichung folgt

$$\begin{aligned} \|\mathbf{y}(x) - \mathbf{y}^0\|_{[C(I)]^n} &\leq \|\mathbf{y}(x) - \mathbf{y}^{(k)}(x)\|_{[C(I)]^n} + \|\mathbf{y}^{(k)}(x) - \mathbf{y}^0\|_{[C(I)]^n} \\ &\leq \|\mathbf{y}(x) - \mathbf{y}^{(k)}(x)\|_{[C(I)]^n} + b. \end{aligned}$$

Bildet man auf beiden Seiten den Grenzwert $k \rightarrow \infty$, erhält man

$$\|\mathbf{y}(x) - \mathbf{y}^0\|_{[C(I)]^n} \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \|\mathbf{y}(x) - \mathbf{y}^{(k)}(x)\|_{[C(I)]^n} + b = b.$$

Nach Voraussetzung ist $\mathbf{y} \in [C(I)]^n$. Demzufolge ist $\mathbf{y} \in A$.

T ist eine Abbildung von A in sich. Als nächstes wird gezeigt, dass T die abgeschlossene Menge A in sich abbildet, unter der Bedingung, dass (6.22) erfüllt ist. Im ersten Teil des

Beweises wurde schon gezeigt, dass das Bild von T aus $[C(I)]^n$ ist. Außerdem gilt, wobei auch (6.21) verwendet wird,

$$\left\| (T\mathbf{y})(x) - \mathbf{y}^0 \right\|_{[C(I)]^n} = \left\| \int_{x^{(0)}}^x \mathbf{f}(t, \mathbf{y}(t)) \, dt \right\|_{[C(I)]^n} \leq M \left| x - x^{(0)} \right| \leq Mc \leq b.$$

Also liegt das Bild von T in A .

T ist kontrahierend. Jetzt muss noch gezeigt werden, dass T kontrahierend ist. Seien $\hat{\mathbf{y}}, \tilde{\mathbf{y}} \in A$, dann folgt mit der Lipschitz-Stetigkeit in der zweiten Komponente (6.20) und (6.22)

$$\begin{aligned} \|(T\hat{\mathbf{y}})(x) - (T\tilde{\mathbf{y}})(x)\|_{[C(I)]^n} &= \left\| \int_{x^{(0)}}^x \mathbf{f}(t, \hat{\mathbf{y}}(t)) - \mathbf{f}(t, \tilde{\mathbf{y}}(t)) \, dt \right\|_{[C(I)]^n} \\ &\leq \int_{\min\{x^{(0)}, x\}}^{\max\{x^{(0)}, x\}} \|\mathbf{f}(t, \hat{\mathbf{y}}(t)) - \mathbf{f}(t, \tilde{\mathbf{y}}(t))\|_{[C(Q)]^n} \, dt \\ &\leq L \int_{\min\{x^{(0)}, x\}}^{\max\{x^{(0)}, x\}} \|\hat{\mathbf{y}}(t) - \tilde{\mathbf{y}}(t)\|_{[C(I)]^n} \, dt \\ &\leq L \left| x - x^{(0)} \right| \|\hat{\mathbf{y}}(x) - \tilde{\mathbf{y}}(x)\|_{[C(I)]^n} \\ &\leq \frac{1}{\alpha} \|\hat{\mathbf{y}}(x) - \tilde{\mathbf{y}}(x)\|_{[C(I)]^n}. \end{aligned}$$

Wegen $\alpha > 1$ ist die Abbildung damit kontrahierend.

Damit sind alle Voraussetzungen des Banachschen Fixpunktsatzes erfüllt. Die Abbildung besitzt also einen eindeutigen Fixpunkt und die sukzessive Approximation (6.23) konvergiert gegen diesen Fixpunkt. Dass der Fixpunkt eine stetig differenzierbare Funktion ist, wurde bereits im ersten Teil des Beweises gezeigt. ■

Bemerkung 6.49 *Zum Satz von Picard-Lindelöf.*

- Die Einzigkeit der Lösung folgt aus der Lipschitz-Bedingung an die rechte Seite, siehe Beispiel 6.50.
- Erhöht man die Grenzen a oder b des Quaders Q , so können die Konstanten L und M höchstens wachsen und das von Satz 6.48 garantierte Existenzintervall einer eindeutigen Lösung kann höchstens kleiner werden. Das von diesem Satz garantierte Intervall ist aber im Allgemeinen nicht das maximale Intervall, siehe Beispiel 6.51.
- Unter stärkeren Voraussetzungen an $\mathbf{f}(x, \mathbf{y})$ kann man eine globale Existenz und Eindeutigkeit der Lösung, das heißt im Intervall $[x^{(0)} - a, x^{(0)} + a]$, erwarten, siehe Satz 6.52 für Details.

□

Beispiel 6.50 *Nichteindeutigkeit der Lösung bei verletzter Lipschitz-Bedingung.* Betrachte

$$y'(x) = \sqrt[3]{y(x)}, \quad y(0) = 0.$$

Die Voraussetzungen von Satz 6.48 sind bis auf die Lipschitz-Bedingung erfüllt. Die Funktion $f(y)$ ist in keiner Umgebung von $y^0 = 0$ Lipschitz-stetig. Das obige Problem besitzt unendliche viele in \mathbb{R} definierte Lösungen

$$y_\sigma = \begin{cases} 0 & \text{für } x \leq \sigma, \\ \left(\frac{2}{3}(x - \sigma)\right)^{3/2} & \text{für } x > \sigma, \end{cases}$$

mit $\sigma \in \mathbb{R}_0^+$ beliebig, siehe Abbildung 6.6.

□




Abbildung 6.6: Lösungen von Beispiel 6.50.

Beispiel 6.51 *Nichtmaximalität des Existenzintervalls einer eindeutigen Lösung.* Betrachte

$$y'(x) = y^3(x), \quad y(0) = 1,$$

also $f(x, y) = y^3$, $x^{(0)} = 0$, $y^{(0)} = 1$. Die Voraussetzungen des lokalen Satzes von Picard-Lindelöf, Satz 6.48, sind für jedes feste $a > 0$ und jedes feste $b > 0$ erfüllt. Es gelten

$$|f(x, y)| = |y^3| \implies \max_{(x,y) \in Q} |f(x, y)| = \max_{y \in [-b+1, b+1]} |y^3| = (b+1)^3 = M$$

und, mit Lemma 6.43,

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = 3y^2 \implies L = \max_{y \in [-b+1, b+1]} |3y^2| = 3(b+1)^2.$$

Nach dem lokalen Existenz- und Eindeutigkeitssatz von Picard-Lindelöf gibt es eine eindeutige Lösung $y : [-c, c] \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$c = \min \left\{ \frac{1}{\alpha L}, \frac{b}{M} \right\} = \min \left\{ \frac{1}{\alpha 3(b+1)^2}, \frac{b}{(b+1)^3} \right\}, \quad \alpha > 1.$$

Der zweite Term nimmt sein Maximum 0.148148 für $b = 1/2$ an, so dass das c aus diesem Satz nicht größer als dieser Wert ist. Die analytische Lösung des Problems ist

$$y(x) = (1 - 2x)^{-1/2}, \quad x \in \left(-\infty, \frac{1}{2} \right).$$

Nähert man sich dem Punkt $x = 0.5$, dann kommt es zu einem sogenannten Blow-up, siehe Abbildung 6.7.

Die Bestimmung des maximalen Definitionsbereiches von Lösungen von gewöhnlichen Differentialgleichungen ist ein wichtiges Gebiet, auf welches aus Zeitgründen allerdings nicht eingegangen werden kann. \square

Satz 6.52 Globaler Existenz- und Eindeutigkeitssatz. Sei $f : Q = [x^{(0)} - a, x^{(0)} + a] \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ stetig und im zweiten Argument gleichmäßig Lipschitz-stetig. Das heißt, es existiert ein $L > 0$, so dass für alle $x \in I := [x^{(0)} - a, x^{(0)} + a]$ und alle $\mathbf{y}, \bar{\mathbf{y}} \in \mathbb{R}^n$

$$\|\mathbf{f}(x, \mathbf{y}) - \mathbf{f}(x, \bar{\mathbf{y}})\|_{[C(Q)]^n} \leq L \|\mathbf{y} - \bar{\mathbf{y}}\|_{[C(I)]^n} \quad (6.25)$$

gilt. Dann hat das Anfangswertproblem (6.19) eine eindeutige Lösung $\mathbf{y} \in [C^1(I)]^n$.




Abbildung 6.7: Maximale Lösung von Beispiel 6.51.

Beweis: Für Interessenten.

Der Beweis beruht wieder auf dem Banachschen Fixpunktsatz. Man stattet den Raum $[C(I)]^n$ mit der Norm

$$\|\mathbf{y}\|_e := \max_{x \in I} \left(e^{-L|x-x^{(0)}|} \|\mathbf{y}(x)\|_{[C(I)]^n} \right) \quad (6.26)$$

aus. Man kann zeigen, dass $\|\mathbf{y}\|_e$ und $\|\mathbf{y}\|_{[C(I)]^n}$ äquivalente Normen sind. Demzufolge ist $[C(I)]^n$ ausgestattet mit $\|\mathbf{y}\|_e$ ein Banach-Raum.

Man betrachtet wieder die Abbildung T aus (6.24). Alle Eigenschaften von T , bis auf die Kontraktivität, weist man analog wie im Beweis von Satz 6.48 nach. Zum Beweis der Kontraktivität startet man wie folgt

$$\|T\hat{\mathbf{y}} - T\tilde{\mathbf{y}}\|_e = \max_{x \in I} \left(e^{-L|x-x^{(0)}|} \left\| \int_{x^{(0)}}^x \mathbf{f}(t, \hat{\mathbf{y}}(t)) - \mathbf{f}(t, \tilde{\mathbf{y}}(t)) dt \right\|_{[C(I)]^n} \right).$$

Wegen des Betrages im Exponenten und wegen der Norm um das Integral kann man an dieser Stelle ohne Beschränkung der Allgemeinheit $x > x^{(0)}$ annehmen. Dann erhält man weiter

$$\begin{aligned} \|T\hat{\mathbf{y}} - T\tilde{\mathbf{y}}\|_e &\leq L \max_{x \in I} \left(e^{-L|x-x^{(0)}|} \int_{x^{(0)}}^x \|\hat{\mathbf{y}}(t) - \tilde{\mathbf{y}}(t)\|_{[C(I)]^n} dt \right) \\ &= L \max_{x \in I} \left(e^{-L|x-x^{(0)}|} \int_{x^{(0)}}^x e^{L(t-x^{(0)})} e^{-L(t-x^{(0)})} \|\hat{\mathbf{y}}(t) - \tilde{\mathbf{y}}(t)\|_{[C(I)]^n} dt \right) \\ &\leq L \max_{x \in I} \left(e^{-L|x-x^{(0)}|} \int_{x^{(0)}}^x e^{L(t-x^{(0)})} dt \right) \times \\ &\quad \max_{t \in [x^{(0)}, x]} \left\{ e^{-L(t-x^{(0)})} \|\hat{\mathbf{y}}(t) - \tilde{\mathbf{y}}(t)\|_{[C(I)]^n} \right\} \\ &= L \max_{x \in I} \left(e^{-L|x-x^{(0)}|} \int_{x^{(0)}}^x e^{L(t-x^{(0)})} dt \right) \|\hat{\mathbf{y}} - \tilde{\mathbf{y}}\|_e \\ &= L \max_{x \in I} \left(e^{-L|x-x^{(0)}|} \frac{e^{L(x-x^{(0)})} - 1}{L} \right) \|\hat{\mathbf{y}} - \tilde{\mathbf{y}}\|_e \\ &= \max_{x \in I} \left(\left(1 - e^{-L|x-x^{(0)}|} \right) \right) \|\hat{\mathbf{y}} - \tilde{\mathbf{y}}\|_e \\ &\leq \left(1 - e^{-L \max_{x \in I} |x-x^{(0)}|} \right) \|\hat{\mathbf{y}} - \tilde{\mathbf{y}}\|_e \\ &= \left(1 - e^{-La} \right) \|\hat{\mathbf{y}} - \tilde{\mathbf{y}}\|_e. \end{aligned}$$

Das zeigt die Kontraktivität von T , da $(1 - e^{-La}) < 1$ ist. Die Aussage des Satzes folgt nun mit dem Banachschen Fixpunktsatz. ■

Satz 6.53 Stetige Abhängigkeit der Lösung von der Anfangsbedingung. Seien die Voraussetzungen des globalen Existenz- und Eindeutigkeitsatzes, Satz 6.52, erfüllt. Dann hängt die Lösung $\mathbf{y}(x)$ in der Norm $\|\cdot\|_e$, definiert in (6.26), stetig vom Anfangswert \mathbf{y}^0 ab.

Beweis: Für Interessenten. Der Beweis nutzt Bezeichnungen und Techniken des Beweises von Satz 6.52.

Betrachte die Lösungen $\mathbf{y}(x)$ und $\tilde{\mathbf{y}}(x)$ zu den Anfangswerten \mathbf{y}^0 und $\tilde{\mathbf{y}}^0$. Man verwendet wieder die Darstellung der Lösungen als Fixpunkt einer Integralgleichung. Dann folgt mit Dreiecksungleichung und weiter analog zum Beweis von Satz 6.52

$$\begin{aligned} \|\mathbf{y} - \tilde{\mathbf{y}}\|_e &= \left\| \mathbf{y}^0 - \tilde{\mathbf{y}}^0 + \int_{x^{(0)}}^x (\mathbf{f}(t, \mathbf{y}(t)) - \mathbf{f}(t, \tilde{\mathbf{y}}(t))) dt \right\|_e \\ &\leq \left\| \mathbf{y}^0 - \tilde{\mathbf{y}}^0 \right\|_e + \max_{x \in I} \left(e^{-L|x-x^{(0)}|} \int_{x^{(0)}}^x \|\mathbf{f}(t, \mathbf{y}(t)) - \mathbf{f}(t, \tilde{\mathbf{y}}(t))\|_{[C(Q)]^n} dt \right) \\ &\leq \left\| \mathbf{y}^0 - \tilde{\mathbf{y}}^0 \right\|_e + L \max_{x \in I} \left(e^{-L|x-x^{(0)}|} \int_{x^{(0)}}^x \|\mathbf{y}(t) - \tilde{\mathbf{y}}(t)\|_{[C(I)]^n} dt \right) \\ &\leq \left\| \mathbf{y}^0 - \tilde{\mathbf{y}}^0 \right\|_e + (1 - e^{-La}) \|\mathbf{y} - \tilde{\mathbf{y}}\|_e, \end{aligned}$$

also

$$\|\mathbf{y} - \tilde{\mathbf{y}}\|_e \leq e^{La} \left\| \mathbf{y}^0 - \tilde{\mathbf{y}}^0 \right\|_e.$$

Für $\tilde{\mathbf{y}}^0 \rightarrow \mathbf{y}^0$ folgt also $\tilde{\mathbf{y}}(x) \rightarrow \mathbf{y}(x)$ in $\|\cdot\|_e$. ■

Bemerkung 6.54 Stetige Abhängigkeit der Lösung von den Daten. Neben der stetigen Abhängigkeit der Lösung vom Anfangswert kann man auch die stetige Abhängigkeit der Lösung von der rechten Seite $\mathbf{f}(x, \mathbf{y})$ beweisen (Heuser, 2006, Satz 13.1). Die Abschätzung im Beweis von Satz 6.53 ist dergestalt, dass die Nachbarschaft einer Lösung und einer gestörten Lösung wegen des exponentiellen Faktors ziemlich schlecht sein kann. *Übungsaufgabe mit linearer Differentialgleichung.* □

6.3.3 Der Existenzsatz von Peano

Bemerkung 6.55 Allgemeines. Dies ist der zweite fundamentale Satz der Theorie von Systemen gewöhnlicher Differentialgleichungen 1. Ordnung. Es wird gezeigt, dass schon die Stetigkeit von $\mathbf{f}(x, \mathbf{y})$ für die Existenz einer Lösung ausreicht, allerdings nicht für deren Eindeutigkeit. Da man relativ wenig Voraussetzungen verwendet, wird die verwendete Analysis recht kompliziert. Sie wird hier auch nicht vollständig dargelegt. □

Definition 6.56 Gleichmäßig beschränkte Menge von Funktionen, gleichgradig stetige Menge von Funktionen. Sei \mathcal{F} eine Menge reellwertiger Funktionen mit gemeinsamen Definitionsbereich $D \subset \mathbb{R}^n$. Die Funktionen aus \mathcal{F} heißen gleichmäßig beschränkt, falls eine Konstante M existiert, so dass für alle $\mathbf{x} \in D$ und für alle $f \in \mathcal{F}$ gilt

$$|f(\mathbf{x})| \leq M.$$

Die Funktionen aus \mathcal{F} heißen gleichgradig stetig, falls zu jedem $\varepsilon > 0$ ein $\delta(\varepsilon) > 0$ existiert, so dass für alle \mathbf{x}, \mathbf{x}' mit $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}'\|_\infty < \delta(\varepsilon)$ folgt

$$|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}')| < \varepsilon$$

für alle $f \in \mathcal{F}$. □

Bemerkung 6.57 *Zur gleichgradigen Stetigkeit.* Gleichgradige Stetigkeit ist gegeben, falls:

- jede Funktion aus \mathcal{F} gleichmäßig stetig ist,
- alle Funktionen kommen bei ihrer gleichmäßigen Stetigkeit mit demselben $\delta(\varepsilon)$ aus.

Gleichgradig stetig heißt also, $\delta(\varepsilon)$ ist unabhängig von \mathbf{x} und $f(\mathbf{x})$. \square

Beispiel 6.58 *Gleichmäßig beschränkte Menge, gleichgradig stetige Menge.* In der Menge

$$\mathcal{F} = \{\alpha x : \alpha \in \mathbb{R}, x \in [0, 1]\}$$

sind alle Funktionen beschränkt, aber die Menge ist nicht gleichmäßig beschränkt. Die gleichmäßige Beschränktheit ist beispielsweise für die Menge

$$\mathcal{F} = \{\cos(nx) : n \in \mathbb{N}, x \in [0, 1]\}$$

gegeben.

Sei \mathcal{F} die Menge aller Funktionen $f(x)$, welche in $I = [a, b]$ einer Lipschitz-Bedingung mit einheitlicher Lipschitz-Konstanten L genügen

$$|f(x) - f(x')| \leq L|x - x'| \quad \text{für alle } x, x' \in I, f \in \mathcal{F}.$$

Diese Menge ist gleichgradig stetig, wähle $\delta(\varepsilon) = \varepsilon/L$. \square

Definition 6.59 Gleichmäßig konvergente Funktionenfolge. Sei $\{f_n(\mathbf{x})\}_{n \geq 1}$, $D(f_n) = I \subset \mathbb{R}^n$, eine konvergente Funktionenfolge mit Grenzwert $f(\mathbf{x})$. Die Funktionenfolge heißt gleichmäßig konvergent, falls für jedes $\varepsilon > 0$ ein $n_0(\varepsilon)$ existiert, so dass für alle $\mathbf{x} \in I$ und $n \geq n_0(\varepsilon)$ gilt

$$|f_n(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x})| < \varepsilon.$$

Gleichmäßig heißt, dass $n_0(\varepsilon)$ unabhängig von \mathbf{x} gewählt werden kann. \square

Satz 6.60 Satz von Arzelà–Ascoli⁷. Sei $\{f_n(\mathbf{x})\}_{n \geq 1}$ eine gleichmäßig beschränkte und gleichgradig stetige Funktionenfolge mit kompaktem (abgeschlossen und beschränkt) Definitionsbereich D . Dann kann man aus $\{f_n(\mathbf{x})\}_{n \geq 1}$ eine Teilfolge auswählen, die auf D gleichmäßig konvergiert.

Beweis: Dieser Beweis ist recht technisch. Er beruht auf dem Überdeckungssatz von Heine⁹-Borel¹⁰, siehe Literatur. \blacksquare

Satz 6.61 Existenzsatz von Peano¹¹ Die Funktion $\mathbf{f}(x, \mathbf{y})$ sei stetig auf dem abgeschlossenen und beschränkten (kompakten) Quader

$$Q := \left\{ (x, \mathbf{y}) : \left| x - x^{(0)} \right| \leq a, \left| y_j - y_j^0 \right| \leq b, j = 1, \dots, n \right\}, \quad a, b \in \mathbb{R}^+$$

sowie durch $M > 0$ beschränkt

$$|f_j(x, \mathbf{y})| \leq M \quad \text{auf } Q, j = 1, \dots, n.$$

Sei

$$c := \min \left\{ a, \frac{b}{M} \right\},$$

dann gibt es auf $J := [x^{(0)} - c, x^{(0)} + c]$ mindestens eine Lösung des Anfangswertproblems (6.19).

⁷Cesare Arzelà (1847 – 1912)

⁸Giulio Ascoli (1843 – 1896)

⁹Heinrich Eduard Heine (1828 – 1888)

¹⁰Félix Édouard Justin Émile Borel (1871 – 1956)

¹¹Giuseppe Peano (1858 – 1932).

Beweis: *Idee.* Man konstruiert sich eine geeignete Funktionenfolge, welche die Bedingungen des Satzes von Arzelà-Ascoli erfüllt. Vom Grenzwert einer Teilfolge zeigt man, dass er eine Lösung der Integralgleichung (6.18) ist. Somit ist er auch Lösung des Anfangswertproblems (6.19). Die Details sind für Interessenten.

Konstruktion der Funktionenfolge. Der Beweis wird für $J_r := [x^{(0)}, x^{(0)} + c]$ geführt, für $[x^{(0)} - c, x^{(0)}]$ geht er analog. Es sei Z eine beliebige Zerlegung von J_r in endlich viele Teilintervalle $I_k := [x_k, x_{k+1}]$, $k = 0, \dots, m-1$, $x_0 = x^{(0)}$, $x_m = x^{(0)} + c$. Die maximale Länge eines Teilintervalls sei η_Z . Die Menge aller derartigen Zerlegungen wird mit \mathcal{Z} bezeichnet. Durch

$$\mathbf{y}_Z(x) := \mathbf{y}_Z(x_k) + (x - x_k) \mathbf{f}(x_k, \mathbf{y}_Z(x_k)), \quad \mathbf{y}_Z(x^{(0)}) = \mathbf{y}^0, \quad x \in I_k, \quad (6.27)$$

$k = 0, 1, \dots, m-1$ wird sukzessive auf I_0, \dots, I_{m-1} und damit auf ganz J_r eine von $Z \in \mathcal{Z}$ abhängige stetige Funktion $\mathbf{y}_Z(x)$ definiert. **Bild 1D** Die Funktionen $\mathbf{y}_Z(x)$ sind stückweise lineare Funktionen, Polygonzüge in \mathbb{R}^n .

Man kann diese Funktionen auch mit Integralen schreiben. Setze dazu

$$\mathbf{F}_Z(x) = \mathbf{f}(x_k, \mathbf{y}_Z(x_k)) \quad \text{für } x \in I_k \setminus \{x_{k+1}\}.$$

Das ist eine stückweise konstante Funktion. Aus (6.27) folgt für $x \in I_k$

$$\mathbf{y}_Z(x) = \mathbf{y}_Z(x_k) + \int_{x_k}^x \mathbf{F}_Z(t) dt.$$

Durch sukzessives Einsetzen in $\mathbf{y}_Z(x_k)$ folgt für $x \in J_r$

$$\mathbf{y}_Z(x) = \mathbf{y}_Z(x^{(0)}) + \int_{x^{(0)}}^x \mathbf{F}_Z(t) dt = \mathbf{y}^0 + \int_{x^{(0)}}^x \mathbf{F}_Z(t) dt. \quad (6.28)$$

Wohldefiniertheit und gleichmäßige Beschränktheit der Funktionenmenge. Damit die Folgen $\mathbf{y}_Z(x)$ beziehungsweise $\mathbf{F}_Z(x)$ überhaupt definiert werden können, muss gezeigt werden, dass die dabei verwendeten Argumente im Definitionsbereich von $\mathbf{f}(x, \mathbf{y})$ liegen, insbesondere das zweite Argument. Es muss also gezeigt werden, dass die Funktionenmenge $\{\mathbf{y}_Z(x) : Z \in \mathcal{Z}\}$ in Q definiert ist, das heißt dass gilt

$$\left| y_{Z,j}(x) - y_j^0 \right| \leq b. \quad (6.29)$$

Dies geschieht induktiv. Nach Voraussetzung gilt $|f_j(x, \mathbf{y})| \leq M$ für alle $(x, \mathbf{y}) \in Q$, $j = 1, \dots, n$, also gilt insbesondere

$$\left| f_j(x^{(0)}, \mathbf{y}^0) \right| = \left| F_{Z,j}(x^{(0)}) \right| \leq M. \quad (6.30)$$

Aus (6.28) und (6.30) ergibt sich zunächst für $k=0$ und $x \in I_0$

$$\left| y_{Z,j}(x) - y_j^0 \right| \leq \left| x - x^{(0)} \right| \left| f_j(x^{(0)}, \mathbf{y}^0) \right| \leq \left| x - x^{(0)} \right| M \leq cM \leq b.$$

Beachte, daraus folgt insbesondere $\left| y_{Z,j}(x_1) - y_j^0 \right| \leq b$, da $x_1 \in I_0$. Sei nun (6.29) für $x \in I_l$ bewiesen. Dann gilt insbesondere

$$\left| y_{Z,j}(x_k) - y_j^0 \right| \leq b, \quad k = 0, 1, \dots, l+1.$$

Damit ist $F_{Z,j}(x_k)$, $k = 0, 1, \dots, l+1$, wohldefiniert und nach Voraussetzung dem Betrage nach mit M beschränkt. Es folgt nun mit (6.28) für $x \in I_{l+1}$

$$\left| y_{Z,j}(x) - y_j^0 \right| = \left| \int_{x^{(0)}}^x F_{Z,j}(t) dt \right| \leq \left| x - x^{(0)} \right| M \leq cM \leq b.$$

Das zeigt (6.29) für $x \in J_r$. Man erhält also für $x \in J_r$

$$\|\mathbf{y}_Z(x)\|_{[C(I)]^n} \leq \left\| \mathbf{y}^0 \right\|_{[C(I)]^n} + b.$$

Die Funktionenmenge $\{\mathbf{y}_Z(x) : Z \in \mathcal{Z}\} \subset \left[C([x^{(0)}, x^{(0)} + c]) \right]^n$ ist also gleichmäßig beschränkt.

Gleichgradige Stetigkeit der Funktionenmenge. Wegen (6.28) gilt für eine beliebige positive Zahl ε , für $\delta(\varepsilon) = \varepsilon/M$ und für $\bar{x}_1, \bar{x}_2 \in J_r$

$$|y_{Z,j}(\bar{x}_2) - y_{Z,j}(\bar{x}_1)| = \left| \int_{\bar{x}_1}^{\bar{x}_2} F_{Z,j}(t) dt \right| \leq |\bar{x}_2 - \bar{x}_1| M \leq \delta M = \varepsilon.$$

Die Zahl $\delta(\varepsilon)$ ist dabei von $Z \in \mathcal{Z}$ unabhängig, sie hängt nur von ε und M ab.

Konstruktion einer Lösung. Es sei $\{Z_l\}_{l \geq 1} \subset \mathcal{Z}$ eine Menge ausgezeichneter Zerlegungsfolgen für J_r , das bedeutet, die Länge η_Z des längsten Teilintervalls von Z_l konvergiert gegen Null für $l \rightarrow \infty$. Diese Menge definiert eine zugehörige Funktionenfolge $\{\mathbf{y}_{Z_l}(x)\}_{l \geq 1}$. Nach dem Satz von Arzelà-Ascoli findet man eine gleichmäßig konvergente Teilfolge $\{\mathbf{y}_{Z'_l}(x)\}_{l \geq 1}$. Sei

$$\mathbf{y}^*(x) := \lim_{l \rightarrow \infty} \mathbf{y}_{Z'_l}(x) \quad (6.31)$$

der Grenzwert dieser Teilfolge. Aus der Analysis ist bekannt, dass der Grenzwert einer gleichmäßig konvergenten Folge stetiger Funktionen stetig ist. Da die Funktionen $\mathbf{y}_{Z'_l}(x)$ stetig sind (Polygonzüge), ist somit auch $\mathbf{y}^*(x)$ stetig. Aus (6.28) folgt $\mathbf{y}_{Z'_l}(x^{(0)}) = \mathbf{y}^0$ für alle l und somit gilt für den Grenzwert $\mathbf{y}^*(x^{(0)}) = \mathbf{y}^0$. Jetzt wird gezeigt, dass $\mathbf{y}^*(x)$ eine Lösung von (6.19) ist. Sei $\varepsilon > 0$ beliebig vorgegeben. Wegen der gleichmäßigen Stetigkeit von $f(x, \mathbf{y})$ in Q (folgt aus Stetigkeit auf kompakter Menge) gibt es ein $\delta_1 > 0$ so dass

$$\|\mathbf{f}(x_1, \mathbf{y}_1) - \mathbf{f}(x_2, \mathbf{y}_2)\|_{[C(I)]^n} < \varepsilon, \quad (x_1, \mathbf{y}_1), (x_2, \mathbf{y}_2) \in Q, \quad (6.32)$$

mit $|x_1 - x_2| < \delta_2, \|\mathbf{y}_1 - \mathbf{y}_2\|_{[C(I)]^n} < \delta_1$. Wegen der Stetigkeit von $\mathbf{y}^*(x)$ gibt es ein $\delta_2 > 0$, so dass für $\bar{x}_1, \bar{x}_2 \in J_r$ mit $|\bar{x}_1 - \bar{x}_2| < \delta_2$ gilt

$$\|\mathbf{y}^*(\bar{x}_1) - \mathbf{y}^*(\bar{x}_2)\|_{[C(I)]^n} < \frac{\delta_1}{2}.$$

Setze $\delta' := \min\{\delta_1/2, \delta_2\}$. Sei η_l die größte Länge eines Teilintervalls von Z'_l , dann gibt es wegen der gleichmäßigen Konvergenz der Funktionenfolge ein $l_0 \in \mathbb{N}$, so dass für $l \geq l_0$ und $x \in J_r$ gelten

$$\|\mathbf{y}_{Z'_l}(x) - \mathbf{y}^*(x)\|_{[C(I)]^n} < \delta' \quad \text{und} \quad \eta_l < \delta'.$$

Damit erhält man

$$\begin{aligned} \|\mathbf{y}_{Z'_l}(x_k) - \mathbf{y}^*(x)\|_{[C(I)]^n} &\leq \|\mathbf{y}_{Z'_l}(x_k) - \mathbf{y}^*(x_k)\|_{[C(I)]^n} + \|\mathbf{y}^*(x_k) - \mathbf{y}^*(x)\|_{[C(I)]^n} \\ &< \delta' + \frac{\delta_1}{2} \leq \delta_1. \end{aligned}$$

Außerdem folgt für $x \in [x_k, x_{k+1}]$ und $l \geq l_0$

$$|x - x_k| \leq \eta_l < \delta' \leq \delta_2.$$

Aus (6.32) und den letzten beiden Abschätzungen folgt

$$\|\mathbf{F}_{Z'_l}(x) - \mathbf{f}(x, \mathbf{y}^*(x))\|_{[C(I)]^n} = \|\mathbf{f}(x_k, \mathbf{y}_{Z'_l}(x_k)) - \mathbf{f}(x, \mathbf{y}^*(x))\|_{[C(I)]^n} < \varepsilon.$$

Die Folge $\{\mathbf{F}_{Z'_l}(x)\}_{l \geq 1}$ konvergiert daher auf J_r gleichmäßig mit dem Grenzwert $\mathbf{F}(x) = \mathbf{f}(x, \mathbf{y}^*(x))$. Aus (6.28) erhält man schließlich für $x \in J_r$

$$\begin{aligned} \mathbf{y}^*(x) &= \lim_{l \rightarrow \infty} \mathbf{y}_{Z'_l}(x) = \mathbf{y}^0 + \lim_{l \rightarrow \infty} \int_{x^{(0)}}^x \mathbf{F}_{Z'_l}(t) dt = \mathbf{y}^0 + \int_{x^{(0)}}^x \lim_{l \rightarrow \infty} \mathbf{F}_{Z'_l}(t) dt \\ &= \mathbf{y}^0 + \int_{x^{(0)}}^x \mathbf{f}(t, \mathbf{y}^*(t)) dt. \end{aligned}$$

Integration und Grenzwertbildung dürfen wegen der gleichmäßigen Konvergenz vertauscht werden. Nach Bemerkung 6.40 ist $\mathbf{y}^*(x)$ eine Lösung von (6.19). Da $\mathbf{f}(x, \mathbf{y})$ und $\mathbf{y}^*(x)$ stetig sind, definiert das Integral eine stetig differenzierbare Funktion, also ist auch $(\mathbf{y}^*)'(x)$ stetig. ■

Bemerkung 6.62 *Zusammenfassung der Grundzüge des Beweises.* Der Beweis des Satzes von Peano betrachtet die Integralform des Anfangswertproblems

$$\mathbf{y}(x) = \mathbf{y}(x^{(0)}) + \int_{x^{(0)}}^x \mathbf{f}(t, \mathbf{y}(t)) dt.$$

Man:

- betrachtet eine Zerlegung Z von J ,
- approximiert den Integranden durch die stückweise konstante Funktion $\mathbf{f}(x_k, \mathbf{y}_Z(x_k))$,
- erhält damit eine stetige, stückweise lineare Approximation $\mathbf{y}_Z(x)$ der Lösung.

Man zeigt im Grenzprozess immer feiner werdender Zerlegungen, dass eine Teilfolge der stetigen, stückweise linearen Approximationen gegen eine Lösung der Integralgleichung konvergiert, indem man zeigt, dass die Voraussetzungen des Satzes von Arzelà–Ascoli erfüllt sind. Die Analyse dieses Grenzprozesses ist mathematisch nicht trivial. \square

Bemerkung 6.63 *Eulersches Polygonzugverfahren.* Im Falle der Eindeutigkeit der Lösung von (6.19) stellt jeder der im Beweis konstruierten Polygonzüge eine Approximation der Lösung dar. Dieses Verfahren wird Eulersches Polygonzugverfahren oder explizites Euler-Verfahren oder Vorwärts-Euler-Verfahren genannt. \square

Folgerung 6.64 Existenz der Lösung des Anfangswertproblems zur Riccatischen Differentialgleichung. *Betrachte das Anfangswertproblem zur Riccatischen Differentialgleichung (6.13) mit dem Anfangswert $\mathbf{y}(x^{(0)}) = \mathbf{y}^0$, $x^{(0)} \in [a, b]$. Seien die Funktion $f_i \in C([a, b])$, $i \in \{0, 1, 2\}$, $f_0(x) \neq 0$. Dann besitzt das Anfangswertproblem zu (6.13) eine lokale Lösung.*

Beweis: Unter den gemachten Voraussetzungen ist die rechte Seite der Riccatischen Differentialgleichung stetig. Damit folgt die Aussage unmittelbar aus dem Existenzsatz von Peano. \blacksquare

Bemerkung 6.65 *Andere Beweise des Existenzsatzes von Peano.* Man kann den Existenzsatz von Peano auch mit Hilfe des Schauder¹²schen Fixpunktsatzes beweisen. Dieser sichert die Existenz, jedoch nicht die Eindeutigkeit eines Fixpunktes der Fixpunktgleichung (6.24). Man braucht auch den Satz von Arzelà–Ascoli und zusätzlich einige Hilfsmittel aus der Funktionalanalysis, siehe Emmrich, Anhang 2. Der Beweis mit Schauderschem Fixpunktsatz ist nicht konstruktiv. \square

Bemerkung 6.66 *Zu weiteren Existenz- und Eindeutigkeitsaussagen.* Neben den beiden grundlegenden Existenz- und Eindeutigkeitsaussagen gibt es noch weitere. Ist beispielsweise die rechte Seite der Differentialgleichung in eine Potenzreihe entwickelbar, dann kann man zeigen, dass es in einer Umgebung des Anfangswertes genau eine Lösung gibt, die sich als absolut konvergente Potenzreihe darstellen lässt, Satz von Cauchy. \square

6.4 Allgemeines zu numerischen Verfahren für Anfangswertprobleme

Bemerkung 6.67 *Inhalt.* In diesem Teil werden grundlegende Verfahren vorgestellt, mit denen man die Lösung eines Anfangswertproblems für ein explizites System gewöhnlicher Differentialgleichungen 1. Ordnung

$$\mathbf{y}'(x) = \mathbf{f}(x, \mathbf{y}(x)), \quad \mathbf{y}(x_0) = \mathbf{y}_0,$$

¹²Juliusz Pawel Schauder (1899 – 1943)



Abbildung 6.8: Gitter.

numerisch approximieren kann. Es wird immer vorausgesetzt, dass das Anfangswertproblem in einer Umgebung des Anfangswertes eine eindeutige Lösung besitzt.

Der einfacheren Darstellung wegen werden meist sogar nur Anfangswertprobleme einer skalaren Differentialgleichung 1. Ordnung

$$y'(x) = f(x, y(x)), \quad y(x_0) = y_0, \quad (6.33)$$

betrachtet. Die Erweiterung der Aussagen auf Systeme ist im Allgemeinen unkompliziert. \square

Bemerkung 6.68 *Das explizite Euler-Verfahren.* Dabei handelt es sich um das einfachste numerische Verfahren zur Lösung von Anfangswertproblemen gewöhnlicher Differentialgleichungen. Dieses Verfahren wurde schon beim Beweis des Satzes von Peano verwendet, siehe Bemerkung 6.63. Es wird auch Vorwärts-Euler-Verfahren oder Eulersches Polygonzugverfahren genannt. Dieses Verfahren wurde bereits in CoMa II eingeführt.

Betrachte das Anfangswertproblem (6.33) im Intervall $[x_0, x_e]$. Dieses Intervall wird in N gleichlange (der Einfachheit halber) Teilintervalle zerlegt. Damit erhält man ein Gitter auf $[x_0, x_e]$ und $h = (x_e - x_0)/N$ wird Gitterweite genannt. Die Knoten des Gitters werden durchnummeriert $x_0, x_1, \dots, x_N = x_e$, siehe Abbildung 6.8.

Man betrachtet die zu (6.33) äquivalente Integralgleichung, siehe Bemerkung 6.40,

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y(t)) \, dt.$$

Nun ist man zunächst an einer Approximation der Lösung im Gitterpunkt x_1 interessiert. Es gilt

$$y(x_1) = y_0 + \int_{x_0}^{x_1} f(t, y(t)) \, dt.$$

Der Wert des Integrals wird nun approximiert: Integrand an der unteren Integrationsgrenze mal Länge des Intervalls. Man erhält

$$y_1 = y_0 + f(x_0, y(x_0)) (x_1 - x_0) = y_0 + hf(x_0, y_0).$$

Das ist eine Näherung für $y(x_1)$. Die Schreibweise ist wie folgt:

- Lösung von (6.33): $y(x_k)$,
- numerische Approximation: y_k .

Nun kann man, startend von y_1 , eine Näherung y_2 von $y(x_2)$ auf dieselbe Art und Weise berechnen. Damit erhält man das explizite Euler-Verfahren

$$y_{k+1} = y_k + hf(x_k, y_k), \quad k = 0, 1, 2, \dots, \quad y_0 = y(x_0). \quad (6.34)$$

\square

Beispiel 6.69 *Das explizite Euler-Verfahren.* Betrachte das Anfangswertproblem

$$y'(x) = x, \quad y(x_0 = 0) = 1, \quad x \in [0, 1].$$

Nimmt man als Stützstellen $x_k = k/10$, $k = 0, \dots, 10$, das heißt $h = 1/10$, so erhält man mit dem expliziten Euler-Verfahren

$$\begin{aligned} y_1 &= y_0 + hf(x_0, y_0) = 1 + 0 = 1 \\ y_2 &= y_1 + hf(x_1, y_1) = 1 + \frac{1}{10} \frac{1}{10} = 1.01 \\ &\vdots \\ y_{10} &= y_9 + hf(x_9, y_9) = 1.45. \end{aligned}$$

Die analytische Lösung $y = x^2/2 + 1$ hat im Punkt $x = 1$ den Wert 1.5, der Fehler ist also 0.05.

Mit dem feineren Gitter $h = 1/100$ erhält man $y_{100} = 1.495$, der Fehler ist also nur noch 0.005. \square

Bemerkung 6.70 *Aufgaben der Numerischen Mathematik.* Die Numerische Mathematik von Anfangswertproblemen beschäftigt sich mit folgenden Aufgaben und Fragestellungen:

- Konstruktion von Verfahren zur numerischen Lösung von Anfangswertproblemen für gewöhnliche Differentialgleichungen.
- Welche Bedingungen muss die rechte Seite $f(x, y(x))$ in (6.33) erfüllen, damit ein Verfahren funktioniert?
- Welchen Einfluss hat eine Veränderung der Gitterweite h auf die Genauigkeit von Verfahren?
- Wie kann man sinnvoll nichtkonstante Gitterweiten wählen?
- ...

In Numerik I wird nur eine Einführung in die Numerik von Anfangswertproblemen präsentiert. Dieses Thema wird in Numerik II vertieft, wo es etwa die Hälfte der Vorlesungszeit beanspruchen wird. \square

6.5 Einschrittverfahren

6.5.1 Allgemeines

Definition 6.71 **Gitter, Schrittweite.** Eine Zerlegung I_h des Interval $I = [x_0, x_e]$

$$I_h = \{x_0, x_1, \dots, x_N = x_e\}$$

mit $x_0 < x_1 < \dots < x_N$ wird Gitter genannt. Dabei sind $h_k = x_{k+1} - x_k$ die Schrittweiten. \square

Definition 6.72 **Explizites und implizites Verfahren.** Ein numerisches Verfahren zur Lösung von (6.33) auf einem Gitter I_h wird explizit genannt, falls die Näherung y_{k+1} in x_{k+1} sich direkt durch bereits berechnete Werte y_i , $i \leq k$, berechnen lässt. Anderenfalls heißt das Verfahren implizit. Implizite Verfahren benötigen in jedem Schritt die Lösung einer im allgemeinen nichtlinearen Gleichung zur Berechnung von y_{k+1} . \square

Definition 6.73 **Einschrittverfahren, Verfahrensfunktion.** Ein Einschrittverfahren zur Bestimmung einer Näherungslösung y_{k+1} von (6.33) auf einem Gitter I_h hat die Gestalt

$$y_{k+1} = y_k + h_k \Phi(x, y, h_k), \quad k = 0, 1, \dots, \quad x \in [x_k, x_{k+1}], \quad y_0 = y(x_0). \quad (6.35)$$

Hierbei wird $\Phi(\cdot, \cdot, \cdot)$ die Verfahrensfunktion oder die Zuwachsfunktion des Einschrittverfahrens genannt. \square




Abbildung 6.9: Illustration zur Definition des lokalen Fehlers.

Beispiel 6.74 *Einschrittverfahren, Verfahrensfunktion.* Das explizite Euler-Verfahren

$$y_{k+1} = y_k + h_k f(x_k, y_k), \quad k = 0, 1, 2, \dots, \quad y_0 = y(x_0),$$

ist ein explizites Einschrittverfahren mit der Verfahrensfunktion

$$\Phi(x, y, h_k) = f(x_k, y_k).$$

Das implizite Euler-Verfahren

$$y_{k+1} = y_k + h_k f(x_{k+1}, y_{k+1}), \quad k = 0, 1, 2, \dots, \quad y_0 = y(x_0),$$

ist ein implizites Einschrittverfahren mit der Verfahrensfunktion

$$\Phi(x, y, h_k) = f(x_{k+1}, y_{k+1}).$$

Zur Berechnung von y_{k+1} muss man bei diesem Verfahren eine Gleichung lösen. Wie kompliziert das ist, hängt von der Funktion $f(x, y)$ ab. \square

6.5.2 Konsistenz und Konvergenz expliziter Einschrittverfahren

Bemerkung 6.75 *Darstellung impliziter Einschrittverfahren.* Explizite Einschrittverfahren erfordern nur das Einsetzen bekannter Werte, womit man ihre Verfahrensfunktion letztlich in der Gestalt $\Phi(x_k, y_k, h_k)$ schreiben kann. Für die Betrachtungen dieses Kapitels kann man sich auf den Standpunkt stellen, dass auch implizite Einschrittverfahren als explizite Einschrittverfahren geschrieben werden können, bei denen man jedoch im Allgemeinen die Verfahrensfunktion nicht kennt, da die Daten für die nichtlineare Gleichung x_k, y_k, h_k sind. \square

Definition 6.76 Lokaler Fehler. Sei \hat{y}_{k+1} das Resultat eines Schrittes mit dem expliziten Einschrittverfahren (6.35) mit dem Startwert auf der Lösung $y(x)$, das heißt

$$\hat{y}_{k+1} = y(x_k) + h_k \Phi(x_k, y(x_k), h_k).$$

Dann heißt

$$\text{le}(x_{k+1}) = \text{le}_{k+1} = y(x_{k+1}) - \hat{y}_{k+1} \quad (6.36)$$

lokaler Fehler (local error), siehe Abbildung 6.9. \square

Bemerkung 6.77 *Zum lokalen Fehler.* Der lokale Fehler beschreibt den Fehler für einen Schritt des Einschrittverfahrens, wenn man diesen Schritt von der analytischen Lösung des Anfangswertproblems startet. In der Literatur wird zum Teil auch

$$\frac{y(x_{k+1}) - y(x_k)}{h_k} - \Phi(x_k, y(x_k), h_k)$$

als lokaler Fehler bezeichnet.

Für ein brauchbares Verfahren wird man fordern, dass der lokale Fehler in einem geeigneten Sinne klein ist. \square

Definition 6.78 Konsistentes Verfahren. Seien $y(x)$ die Lösung des Anfangswertproblems (6.33), $h_{\max} = \max_k h_k$ und

$$S := \{(x, y) : x \in [x_0, x_e], y \in \mathbb{R}\}.$$

Dann heißt das Einschrittverfahren (6.35) konsistent, wenn für alle $f \in C(S)$, die in S einer Lipschitz-Bedingung bezüglich y genügen, gilt

$$\lim_{h_{\max} \rightarrow 0} \left(\max_{x_k \in I_h} \frac{|\text{le}(x_{k+1})|}{h_k} \right) = 0$$

oder

$$\lim_{h_{\max} \rightarrow 0} \left(\max_{x_k \in I_h} |f(x_k, y(x_k)) - \Phi(x_k, y(x_k), h_k)| \right) = 0.$$

Beide Bedingungen sind äquivalent. *Übungsaufgabe* \square

Bemerkung 6.79 *Approximation der Ableitung durch Verfahrensfunktion.* Dass der lokale Fehler für $h_{\max} \rightarrow 0$ gegen Null konvergiert ist für jede beschränkte Verfahrensfunktion klar, da in diesem Fall $h_k \rightarrow 0$ und $\hat{y}_{k+1} \rightarrow y(x_k)$. Konsistenz verlangt mehr, nämlich dass die Verfahrensfunktion die Ableitung hinreichend gut approximiert

$$\frac{\text{le}(x_{k+1})}{h_k} = \frac{y(x_{k+1}) - y(x_k)}{h_k} - \Phi(x_k, y(x_k), h_k) \approx y'(x_k) - \Phi(x_k, y(x_k), h_k).$$

\square

Beispiel 6.80 *Konsistenz des explizites Euler-Verfahrens.* Im expliziten Euler-Verfahren gilt $\Phi(x_k, y(x_k), h_k) = f(x_k, y(x_k))$. Damit ist die zweite Bedingung aus Definition 6.78 offensichtlich erfüllt und das Verfahren ist konsistent. \square

Bemerkung 6.81 *Approximationsgüte der Verfahrensfunktion.* Für praktische Belange ist nicht nur die Konsistenz, sondern auch die Güte der Approximation der Ableitung durch die Verfahrensfunktion wesentlich. Dies gestattet den Vergleich verschiedener Einschrittverfahren. Der einfacheren Darstellung halber sei nun $h_k = h$ für alle k . \square

Definition 6.82 *Konsistenzordnung.* Ein explizites Einschrittverfahren (6.35) besitzt die Konsistenzordnung $p \in \mathbb{N}$, wenn p die größte natürliche Zahl ist, so dass für jede Funktion $f \in C(S)$, die bezüglich y einer Lipschitz-Bedingung genügt und die hinreichend glatt ist, gilt

$$|\text{le}(x_k + h)| \leq ch^{p+1}$$

für alle $x_k \in I_h$, für alle I_h mit $h \in (0, H]$, mit einer von h unabhängigen Konstante $c > 0$. Die Konstante c kann von Ableitungen der Funktion $y(x)$, von $f(x, y)$ und von partiellen Ableitungen von $f(x, y)$ abhängen. \square

Beispiel 6.83 *Konsistenzordnung des expliziten Euler-Verfahrens.* Betrachte wieder das explizite Euler-Verfahren und nehme an, dass die Funktion $y(x)$ zweimal stetig differenzierbar ist. Dann folgt mit Hilfe der Taylor-Entwicklung und der Differentialgleichung

$$\begin{aligned} |le(x_k + h)| &= |y(x_k + h) - \hat{y}_{k+1}| \\ &= |y(x_k) + hy'(x_k) + \frac{h^2}{2}y''(x_k + \theta h) - y(x_k) - h \underbrace{f(x_k, y(x_k))}_{=y'(x_k)}| \\ &= \frac{h^2}{2} |y''(x_k + \theta h)| \leq \frac{h^2}{2} \|y''\|_{C^2([x_0, x_e])}, \end{aligned}$$

mit $\theta \in (0, 1)$. Das Verfahren hat damit die Konsistenzordnung 1. \square

Bemerkung 6.84 *Konsistenz und Konvergenz.* Die Konsistenz ist eine lokale Eigenschaft eines Einschrittverfahrens. Für praktische Belange ist jedoch die Frage wichtig, ob die numerisch berechnete Lösung gegen die analytische Lösung des Anfangswertproblems konvergiert, wenn man das Gitter immer mehr verfeinert. Die Geschwindigkeit der Konvergenz ist natürlich ebenso wichtig.

Es wird sich zeigen, dass unter bestimmten Bedingungen aus der Konsistenz eines Einschrittverfahrens dessen Konvergenz folgt. Dabei ist die Konvergenzordnung gleich der Konsistenzordnung. \square

Definition 6.85 **Konvergentes Verfahren, Konvergenzordnung.** Ein Einschrittverfahren (6.35) heißt konvergent für das Anfangswertproblem (6.33) auf dem Intervall $I = [x_0, x_e]$, wenn für jede Folge von Gittern $\{I_h\}$ mit $h_{\max} = \max_{h_k \in I_h} h_k \rightarrow 0$ für den globalen Fehler

$$e(x_k, h) = y(x_k) - y_k, \quad x_k \in I_h,$$

gilt

$$\max_{x_k \in I_h} |e(x_k, h)| \rightarrow 0 \quad \text{für} \quad h_{\max} \rightarrow 0.$$

Das Einschrittverfahren besitzt die Konvergenzordnung p^* , wenn p^* die größte natürliche Zahl ist, so dass für alle Schrittweiten $h_{\max} \in (0, H]$ gilt

$$|e(x_k, h)| \leq ch_{\max}^{p^*} \quad \forall x_k \in I_h,$$

wobei $c > 0$ unabhängig von h_{\max} ist. \square

Lemma 6.86 **Abschätzung für eine Folge reeller Zahlen.** *Gelten für reelle Zahlen x_n , $n = 0, 1, \dots$, die Ungleichungen*

$$|x_{n+1}| \leq (1 + \delta) |x_n| + \beta$$

mit Konstanten $\delta > 0$, $\beta \geq 0$, so gilt

$$|x_n| \leq e^{n\delta} |x_0| + \frac{e^{n\delta} - 1}{\delta} \beta, \quad n = 0, 1, \dots$$

Beweis: Mit vollständiger Induktion, Übungsaufgabe. \blacksquare

Satz 6.87 **Zusammenhang Konsistenz und Konvergenz.** *Sei $y(x)$ die Lösung des Anfangswertproblems (6.33) mit $f \in C(S)$ hinreichend glatt. Des Weiteren genüge die Verfahrensfunktion in der zweiten Komponente einer Lipschitz-Bedingung*

$$|\Phi(x, y_1, h) - \Phi(x, y_2, h)| \leq M |y_1 - y_2| \quad \forall (x, y) \in S, h \in (0, H].$$

Ferner gelte für den lokalen Fehler die Abschätzung

$$|le(x_k + h)| \leq ch^{p+1} \quad \forall x_k \in I_h, h \in (0, H]$$

und es sei $y_0 = y(x_0)$.

Dann gilt für den globalen Fehler

$$|e(x_{k+1}, h)| \leq c \frac{e^{M(x_{k+1}-x_0)} - 1}{M} h^p,$$

wobei c unabhängig von h ist.

Beweis: Es gelten, unter Nutzung von Bemerkung 6.75 und der Definition (6.36) des lokalen Fehlers,

$$\begin{aligned} y_{k+1} &= y_k + h\Phi(x_k, y_k, h), \\ y(x_{k+1}) &= y(x_k) + h\Phi(x_k, y(x_k), h) + le(x_{k+1}), \quad k = 0, 1, \dots \end{aligned}$$

Daraus folgt mit der Dreiecksungleichung und mit der Lipschitz-Bedingung an die Verfahrensfunktion

$$\begin{aligned} |e(x_{k+1}, h)| &= |y(x_{k+1}) - y_{k+1}| \\ &= |y(x_k) - y_k + le(x_{k+1}) + h(\Phi(x_k, y(x_k), h) - \Phi(x_k, y_k, h))| \\ &= |e(x_k, h) + le(x_{k+1}) + h(\Phi(x_k, y(x_k), h) - \Phi(x_k, y_k, h))| \\ &\leq |e(x_k, h)| + |le(x_{k+1})| + h|\Phi(x_k, y(x_k), h) - \Phi(x_k, y_k, h)| \\ &\leq |e(x_k, h)| + ch^{p+1} + hM|y(x_k) - y_k| \\ &= (1 + hM)|e(x_k, h)| + ch^{p+1}. \end{aligned}$$

Damit hat man eine Ungleichungskette der Form, wie sie in Lemma 6.86 betrachtet wurde. Man erhält mit $e(x_0) = 0$

$$|e(x_{k+1}, h)| \leq e^{(k+1)hM} |e(x_0)| + c \frac{e^{(k+1)hM} - 1}{hM} h^{p+1} = c \frac{e^{M(x_{k+1}-x_0)} - 1}{M} h^p. \quad \blacksquare$$

Bemerkung 6.88 Zu Satz 6.87.

- Die Konstante in der Fehlerschranke kann wegen des exponentiellen Terms sehr groß werden, insbesondere wenn M groß ist oder das Intervall lang ist.
- Die Betrachtung einer konstanten Schrittweite war nur der Einfachheit halber. Die Aussage des Satzes lässt sich auf nicht-konstante Schrittweiten ausdehnen. Dann setzt man $h = \max_k h_k$.
- Das Einschrittverfahren liefert eine Näherung y_k für die Lösung in den Gitterpunkten x_k , $k = 0, 1, \dots, N$. Damit man besser mit der analytischen Lösung vergleichen kann, verbindet man diese Punkte mit Geradenstücken von (x_k, y_k) nach (x_{k+1}, y_{k+1}) . Damit erhält man eine stückweise lineare Näherung der Lösung, die auf $[x_0, x_e]$ definiert ist. Diese Funktion wird $y^h(x)$ genannt. Die obigen Betrachtungen lassen sich auf diese Funktion $y^h(x)$ ausdehnen. \square

6.5.3 Runge–Kutta-Verfahren

Bemerkung 6.89 Grundidee. Die Euler-Verfahren sind nur Verfahren erster Ordnung. Die Grundidee von Runge¹³–Kutta¹⁴-Verfahren besteht darin, die Verfahrensfunktion $\Phi(x, y, h)$ durch eine Linearkombination von Werten von $f(x, y)$ in

¹³Carle David Tolmé Runge (1856 – 1927)

¹⁴Martin Kutta (1867 – 1944)

diskreten Punkten anzusetzen. Man erhält dadurch Verfahren höherer Ordnung für den Preis, dass man mehr Funktionswerte berechnen muss.

Das kann man gut an der zum Anfangswertproblem (6.33) äquivalenten Integralgleichung illustrieren. Hänge der Einfachheit halber die rechte Seite von (6.33) nur von x ab, dann hat die zu (6.33) gehörende Integralgleichung die Gestalt

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t) dt. \quad (6.37)$$

Die Idee der Runge–Kutta-Verfahren besteht nun darin, das Integral auf der rechten Seite durch eine Quadraturformel zu approximieren, etwa im Intervall $[x_k, x_{k+1}]$ durch

$$\int_{x_k}^{x_{k+1}} f(t) dt \approx h_k \sum_{j=1}^s b_j f(x_k + c_j h_k)$$

mit den Gewichten b_j und den Knoten $x_k + c_j h$.

Im Weiteren wird der Einfachheit halber $h_k = h$ für alle k betrachtet. \square

Definition 6.90 Runge–Kutta-Verfahren, Steigungen, Stufen. Ein Runge–Kutta-Verfahren hat die Gestalt

$$y_{k+1} = y_k + h\Phi(x, y, h), \quad k = 0, 1, \dots, \quad y_0 = y(x_0),$$

wobei die Verfahrensfunktion mit Hilfe der Größen

$$K_i(x, y) = f\left(x + c_i h, y + h \sum_{j=1}^s a_{ij} K_j(x, y)\right)$$

durch

$$\Phi(x, y, h) = \sum_{i=1}^s b_i K_i(x, y)$$

definiert ist, mit $c_1, \dots, c_s, b_1, \dots, b_s, a_{ij} \in \mathbb{R}$, $i, j = 1, \dots, s$. Die Größen $K_i(x, y)$, $i = 1, \dots, s$, werden Steigungen genannt. Die Zahl $s \in \mathbb{N}$ ist die Anzahl der Stufen des Verfahrens. \square

Bemerkung 6.91 Butcher¹⁵-Schema. Der besseren Übersichtlichkeit halber schreibt man Runge–Kutta-Verfahren im Allgemeinen in einem Parameterschema, dem sogenannten Butcher-Schema

$$\begin{array}{c|cccc} c_1 & a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1s} \\ c_2 & a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2s} \\ c_3 & a_{31} & a_{32} & \cdots & a_{3s} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_s & a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{ss} \\ \hline & b_1 & b_2 & \cdots & b_s \end{array} \implies \frac{\mathbf{c}}{\mathbf{b}^T} \Big| \frac{A}{\mathbf{b}^T}. \quad (6.38)$$

Dabei werden \mathbf{c} Knotenvektor, A Verfahrensmatrix und \mathbf{b} Gewichtsvektor genannt. \square

¹⁵John C. Butcher, geb. 1933

6.5.4 Explizite Runge–Kutta-Verfahren

Bemerkung 6.92 *Steigungen und Butcher-Schema.* Bei expliziten Runge–Kutta-Verfahren können die Steigungen nacheinander berechnet werden

$$\begin{aligned} K_1(x, y) &= f(x_k, y_k), \\ K_2(x, y) &= f(x_k + c_2 h, y_k + h a_{21} K_1(x, y)), \\ &\vdots \\ K_s(x, y) &= f\left(x_k + c_s h, y_k + h \sum_{j=1}^{s-1} a_{sj} K_j(x, y)\right). \end{aligned}$$

Das Butcher-Schema besitzt die Gestalt

$$\begin{array}{c|cccc} 0 & & & & \\ c_2 & a_{21} & & & \\ c_3 & a_{31} & a_{32} & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \\ c_s & a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{s,s-1} \\ \hline & b_1 & b_2 & \cdots & b_{s-1} & b_s \end{array}$$

□

Beispiel 6.93 *Explizites Euler-Verfahren.* Das explizite Euler-Verfahren ist ein explizites Runge–Kutta-Verfahren mit dem Butcher-Schema

$$\begin{array}{c|c} 0 & \\ \hline & 1 \end{array}$$

In der Integralgleichung wird die Approximation

$$\int_{x_k}^{x_{k+1}} f(t, y(t)) dt \approx h f(x_k, y_k)$$

verwendet, siehe auch Beweis des Satzes von Peano, Satz 6.61. □

Satz 6.94 Konsistenz expliziter Runge–Kutta-Verfahren. Sei $f \in C(S)$, siehe Definition 6.78. Ein explizites Runge–Kutta-Verfahren ist genau dann konsistent, wenn

$$\sum_{i=1}^s b_i = 1. \tag{6.39}$$

Beweis: Wegen der Stetigkeit von $f(x, y)$ gilt

$$\lim_{h \rightarrow 0} K_i(x, y) = f(x_k, y(x_k)), \quad \forall (x, y) \in S, \quad i = 1, \dots, s,$$

für den Fall, dass man den exakten Startwert $y_k = y(x_k)$ hat. Damit folgt wegen der Stetigkeit des Betrages

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} |f(x_k, y(x_k)) - \Phi(x_k, y(x_k), h_k)| &= \lim_{h \rightarrow 0} \left| f(x_k, y(x_k)) - \sum_{i=1}^s b_i K_i(x, y) \right| \\ &= \left| f(x_k, y(x_k)) - \sum_{i=1}^s b_i \lim_{h \rightarrow 0} K_i(x, y) \right| \\ &= \left| f(x_k, y(x_k)) \left(1 - \sum_{i=1}^s b_i \right) \right| = 0 \end{aligned}$$

genau dann, wenn $\sum_{i=1}^s b_i = 1$. Somit ist die zweite Bedingung von Definition 6.78 erfüllt. ■

Satz 6.95 Interpretation der Steigungen. Gelte $y \in C^2([x_0, x_e])$ für die Lösung von (6.33) und sei $f \in C(S)$ sowie in der zweiten Komponente Lipschitz-stetig. Gilt

$$c_i = \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}, \quad i \geq 2, \quad (6.40)$$

so ist $K_i(x, y)$ eine Approximation von mindestens 1. (Konsistenz-)Ordnung an $y'(x_k + c_i h)$ im Falle $y_k = y(x_k)$, das heißt

$$y'(x_k + c_i h) - K_i(x, y) = \mathcal{O}(h^2).$$

Beweis: Der Beweis erfolgt induktiv.

$i = 2$. Für $i = 2$ folgt mit Hilfe von (6.33), der Lipschitz-Stetigkeit und der Taylor-Entwicklung

$$\begin{aligned} & |y'(x_k + c_2 h) - K_2(x, y)| \\ &= |f(x_k + c_2 h, y(x_k + c_2 h)) - f(x_k + c_2 h, y(x_k) + h a_{21} f(x_k, y(x_k)))| \\ &\leq L |y(x_k + c_2 h) - y(x_k) - h a_{21} f(x_k, y(x_k))| \\ &= L |y(x_k) + c_2 h y'(x_k) + \mathcal{O}(h^2) - y(x_k) - h a_{21} y'(x_k)| \\ &= L |(c_2 - a_{21}) h y'(x_k) + \mathcal{O}(h^2)|. \end{aligned}$$

Für $c_2 = a_{21}$ verhält sich der Fehler wie $\mathcal{O}(h^2)$.

$i > 2$. Seien die Fehlerordnungen für alle Indizes $2, \dots, i-1$ bewiesen. Dann folgt auf dem gleichen Weg wie für den Induktionsanfang, wobei man jetzt auch noch die Induktionsvoraussetzung nutzt,

$$\begin{aligned} & |y'(x_k + c_i h) - K_i(x, y)| \\ &= \left| f(x_k + c_i h, y(x_k + c_i h)) - f\left(x_k + c_i h, y(x_k) + h \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} K_j(x, y)\right) \right| \\ &\leq L \left| y(x_k + c_i h) - y(x_k) - h \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} K_j(x, y) \right| \\ \stackrel{\text{Ind.vor.}}{=} & L \left| y(x_k) + c_i h y'(x_k) + \mathcal{O}(h^2) - y(x_k) - h \sum_{j=1}^{i-1} \left(a_{ij} \left(y'(x_k + c_j h) + \mathcal{O}(h^2) \right) \right) \right| \\ &= L \left| c_i h y'(x_k) + \mathcal{O}(h^2) - h \sum_{j=1}^{i-1} \left(a_{ij} \left(y'(x_k) + \mathcal{O}(h) \right) \right) \right| \\ &= L \left| h \left(c_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} \right) y'(x_k) + \mathcal{O}(h^2) \right|. \end{aligned}$$

Das Verhalten $\mathcal{O}(h^2)$ für den Fehler erhält man, wenn $c_i = \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}$ gilt. ■

Bemerkung 6.96 Bedingungen an Koeffizienten für gewisse Konsistenzordnungen. Für viele explizite Runge–Kutta-Verfahren sind die Bedingungen aus den Sätzen 6.94 und 6.95 erfüllt. Das Ziel besteht nun darin, die Koeffizienten b_1, \dots, b_s und a_{ij} so zu bestimmen, dass das Runge–Kutta-Verfahren eine möglichst hohe Konsistenzordnung besitzt. Die Konsistenzordnung eines s -stufigen Runge–Kutta-Verfahrens kann aus der Taylor-Entwicklung des lokalen Fehlers hergeleitet werden. Man findet beispielsweise:

- Ein Runge–Kutta-Verfahren mit den Parametern $(A, \mathbf{b}, \mathbf{c})$ hat dann mindestens die Konsistenzordnung $p = 2$, wenn

$$\sum_{j=1}^s b_j c_j = \frac{1}{2}. \quad (6.41)$$

Diese Bedingung wird im Beispiel 6.97 für $s = 2$ gezeigt.

- Gelten außerdem

$$\sum_{j=1}^s b_j c_j^2 = \frac{1}{3} \quad \text{und} \quad \sum_{j=1}^s b_j \sum_{k=1}^s a_{jk} c_k = \frac{1}{6},$$

so hat es die Konsistenzordnung $p = 3$.

Die Beweise dieser Aussagen findet man in der Literatur. \square

Beispiel 6.97 *Zweistufige Runge-Kutta-Verfahren.* Zur Untersuchung zweistufiger Runge-Kutta-Verfahren betrachtet man der Einfachheit halber das sogenannte autonome Anfangswertproblem

$$y'(x) = f(y(x)), \quad y(x_0) = y_0,$$

das heißt, die rechte Seite hängt nicht explizit von x ab. Für die Steigungen gilt

$$\begin{aligned} K_1(y) &= f(y_k), \\ K_2(y) &= f(y_k + ha_{21}K_1(y_k)) = f(y_k + ha_{21}f(y_k)) \\ &= f(y_k) + ha_{21}f(y_k)f_y(y_k) + \mathcal{O}(h^2). \end{aligned}$$

Damit gilt für die Verfahrensfunktion im Falle eines exakten Startwertes

$$\begin{aligned} \Phi(y(x_k)) &= b_1 K_1(y) + b_2 K_2(y) \\ &= (b_1 + b_2)f(y(x_k)) + hb_2 a_{21}f(y(x_k))f_y(y(x_k)) + \mathcal{O}(h^2). \end{aligned}$$

Die Taylor-Entwicklung der Lösung besitzt die Gestalt

$$y(x_k + h) = y(x_k) + h \underbrace{y'(x_k)}_{=f(y(x_k))} + \frac{h^2}{2} y''(x_k) + \mathcal{O}(h^3).$$

Mit Kettenregel erhält man

$$y''(x) = \frac{d}{dx} y'(x) = \frac{d}{dx} f(y(x)) = f_y(y) y'(x) = f_y(y) f(y(x)).$$

Damit folgt für den lokalen Fehler

$$\begin{aligned} \text{le}(x_k + h) &= y(x_k + h) - y(x_k) - h\Phi(y(x_k)) \\ &= y(x_k) + hf(y(x_k)) + \frac{h^2}{2} (f_y(y(x_k))f(y(x_k))) + \mathcal{O}(h^3) - y(x_k) \\ &\quad - h\left((b_1 + b_2)f(y(x_k)) + hb_2 a_{21}f(y(x_k))f_y(y(x_k)) + \mathcal{O}(h^2)\right) \\ &= h(1 - (b_1 + b_2))f(y(x_k)) + h^2 \left(\frac{1}{2} - b_2 a_{21}\right) f(y(x_k))f_y(y(x_k)) \\ &\quad + \mathcal{O}(h^3). \end{aligned}$$

Für eine möglichst hohe Konsistenzordnung müssen die ersten beiden Terme verschwinden. Man erhält mit der Bedingung $c_2 = a_{21}$, vergleiche Satz 6.95,

$$b_1 + b_2 = 1, \quad b_2 a_{21} = \frac{1}{2} \iff b_2 c_2 = \frac{1}{2}.$$

Die erste Bedingung ist die allgemeine Konsistenzbedingung (6.39) und die zweite Bedingung ist genau (6.41) für $s = 2$. Mit diesen beiden Bedingungen sind alle 2-stufigen expliziten Runge–Kutta-Verfahren charakterisiert, welche die Konsistenz- und Konvergenzordnung 2 besitzen

$$\frac{c_2}{1 - \frac{c_2}{2c_2} - \frac{1}{2c_2}}, \quad \text{mit } c_2 \neq 0.$$

Für $c_2 = 1/2$ erhält man die Methode von Runge (1895)

$$\frac{1/2}{0} \mid \frac{1/2}{1}.$$

Bezüglich der Approximation des Integrals in (6.37) entspricht das der Nutzung der Mittelpunkregel.

Für $c_2 = 1$ erhält man die Methode von Heun¹⁶ (1900)

$$\frac{1}{1/2} \mid \frac{1}{1/2},$$

was der Nutzung der Trapezregel zur numerischen Quadratur in (6.37) entspricht. \square

Bemerkung 6.98 *Zu autonomen Differentialgleichungen.* Betrachte die explizite Differentialgleichung erster Ordnung

$$\mathbf{y}'(x) = \mathbf{f}(\mathbf{y}(x), x),$$

wobei die Reihenfolge der Argumente der rechten Seite im Vergleich zu bisher vertauscht ist, damit der folgende Schritt konsistent ist. Durch die Einführung der Funktionen

$$\bar{\mathbf{y}}(x) := x \quad \text{und} \quad \tilde{\mathbf{y}}(x) := \begin{pmatrix} \mathbf{y}(x) \\ \bar{\mathbf{y}}(x) \end{pmatrix}$$

kann diese in die autonome Form

$$\tilde{\mathbf{y}}'(x) = \tilde{\mathbf{f}}(\tilde{\mathbf{y}}(x)) = \begin{pmatrix} \mathbf{f}(\tilde{\mathbf{y}}(x)) \\ 1 \end{pmatrix}$$

gebracht werden. \square

Satz 6.99 Konsistenz und Konvergenz expliziter Runge–Kutta-Verfahren. *Sei $y(x)$ die Lösung des Anfangswertproblems (6.33) mit $f \in C(S)$ und genüge $f(x, y)$ in der zweiten Komponente einer Lipschitz-Bedingung. Dann ist ein explizites Runge–Kutta-Verfahren, welches von Ordnung p konsistent ist auch von Ordnung p konvergent.*

Beweis: Die Verfahrensfunktion bei expliziten Runge–Kutta-Verfahren ist eine Linearkombination von Funktionswerten der rechten Seite $f(x, y)$. Damit ist die Voraussetzung von Satz 6.87 erfüllt, da die dort geforderte Lipschitz-Bedingung an die Verfahrensfunktion bei Runge–Kutta-Verfahren gerade der Lipschitz-Bedingung an die rechte Seite der Differentialgleichung entspricht. Die Aussage folgt somit direkt aus Satz 6.87. \blacksquare

Bemerkung 6.100 *Explizite Runge–Kutta-Verfahren höherer Ordnung.* Analog zu 2-stufigen Verfahren kann man Bedingungen an die Koeffizienten eines expliziten Runge–Kutta-Verfahrens finden, um höhere Ordnungen zu erreichen. Das führt auf nichtlineare Gleichungssysteme, deren Lösung mit wachsender Anzahl der Stufen immer komplizierter wird. Es bleibt noch die Frage, was die Mindestanzahl von Stufen eines expliziten Runge–Kutta-Verfahrens ist, um eine gewisse Ordnung erreichen zu können. Antworten gab Butcher (1963, 1965, 1985)

¹⁶Karl Heun (1859 – 1929)

p	1	2	3	4	5	6	7	8
$\min s$	1	2	3	4	6	7	9	11

□

Beispiel 6.101 *Klassisches Runge–Kutta-Verfahren (1901).* Das sogenannte klassische Runge–Kutta-Verfahren ist ein vierstufiges Verfahren mit dem Butcher-Schema

0				
1/2	1/2			
1/2	0	1/2		
1	0	0	1	
	1/6	1/3	1/3	1/6

Es basiert auf der Simpson¹⁷-Formel. Der mittlere Knoten der Simpson-Formel wird zweimal betrachtet, $c_2 = c_3$, jedoch mit anderen zweiten Argumenten in der Berechnung der Steigungen. Dieses Verfahren ist von vierter Ordnung. □

6.5.5 Implizite Runge–Kutta-Verfahren

Bemerkung 6.102 *Herleitung von impliziten Runge–Kutta-Verfahren.* Implizite Runge–Kutta-Verfahren werden aus der Integraldarstellung (6.37) des Anfangswertproblems hergeleitet. Man kann zeigen, dass für jedes implizite Runge–Kutta-Verfahren mit Gewichten b_j und Knoten $x_k + c_j h$ eine entsprechende Quadraturformel mit den gleichen Gewichten und Knoten existiert, siehe Abschnitt 4.3. □

Beispiel 6.103 *Gauß-Legendre Quadraturpunkte.* Betrachte das Intervall $[x_k, x_k + h] = [x_k, x_{k+1}]$. Seien c_1, \dots, c_s die Nullstellen des Legendre-Polynoms $P_s(t)$ in der Variablen

$$t = \frac{2}{h}(x - x_k) - 1 \implies t \in [-1, 1].$$

Es gibt s verschiedene reelle Nullstellen in $(-1, 1)$. Hat man c_1, \dots, c_s berechnet, kann man die Koeffizienten a_{ij}, b_j so bestimmen, dass man ein Verfahren der Ordnung $2s$ erhält. Dazu muss man die linearen Systeme

$$\sum_{j=1}^s c_j^{k-1} a_{ij} = \frac{c_i^k}{k}, \quad \sum_{j=1}^s c_j^{k-1} b_j = \frac{1}{k}, \quad k = 1, \dots, s,$$

lösen. Zur Herleitung dieser Bedingungen siehe Literatur. □

Beispiel 6.104 *Klassen von impliziten Runge–Kutta-Verfahren.*

- *Gauß-Legendre-Verfahren.* Es werden die Gauß-Legendre-Quadraturknoten genutzt. Ein s -stufiges Verfahren besitzt die (maximal mögliche !) Ordnung $2s$. Alle Quadraturpunkte liegen im Inneren des Intervalls.
Beispiel: Implizite Mittelpunkregel, $s = 1, p = 2$,

$$\frac{1/2 \mid 1/2}{\mid 1}.$$

- *Gauß-Radau¹⁸-Verfahren.* Diese Verfahren sind dadurch charakterisiert, dass einer der beiden Endpunkte des Intervalls $[x_k, x_{k+1}]$ zu den Quadraturpunkten gehört. Ein s -stufiges Verfahren dieser Klasse kann maximal von Ordnung $2s - 1$

¹⁷Thomas Simpson (1710 – 1761)

¹⁸Rodolphe Radau (1835 – 1911)

sein.

Beispiele:

$$\begin{aligned} \circ & \frac{0}{1} \left| \frac{1}{1} \right. & s = 1, p = 1, \\ \circ & \frac{1}{1} \left| \frac{1}{1} \right. & s = 1, p = 1, \text{ implizites Euler-Verfahren.} \end{aligned}$$

Das erste Verfahren erfüllt die Bedingung (6.40) nicht.

- *Gauß-Lobatto*¹⁹-Verfahren. In diesen Verfahren sind beide Endpunkte des Intervalls $[x_k, x_{k+1}]$ Quadraturpunkte. Ein s -stufiges Verfahren dieser Art kann maximal von Ordnung $2s - 2$ sein.

Beispiele:

- Trapezregel, Crank²⁰-Nicolson²¹-Verfahren

$$\begin{array}{c|cc} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1/2 & 1/2 \\ \hline & 1/2 & 1/2 \end{array} \quad s = p = 2.$$

Man hat bei diesem Verfahren *Übungsaufgabe*

$$\begin{aligned} K_1(x, y) &= f(x_k, y_k), \\ K_2(x, y) &= f\left(x_k + h, y_k + \frac{h}{2}K_1(x, y) + \frac{h}{2}K_2(x, y)\right), \\ y_{k+1} &= y_k + \frac{h}{2}K_1(x, y) + \frac{h}{2}K_2(x, y) \\ &= y_k + \frac{h}{2}f(x_k, y_k) + \frac{h}{2}f(x_{k+1}, y_{k+1}). \end{aligned}$$

- anderes Verfahren

$$\begin{array}{c|cc} 0 & 1/2 & 0 \\ 1 & 1/2 & 0 \\ \hline & 1/2 & 1/2 \end{array} \quad s = 2, p = 2.$$

Das zweite Verfahren erfüllt die Bedingung (6.40) nicht. □

Bemerkung 6.105 *Diagonal-implizite Runge-Kutta-Verfahren (DIRK-Verfahren)*. Bei einem s -stufigen Runge-Kutta-Verfahren hat man ein gekoppeltes, nicht-lineares System für $K_1(x, y), \dots, K_s(x, y)$ zu lösen. Für größere s ist das teuer. Ein Kompromiss besteht darin, sogenannte diagonal-implizite Runge-Kutta-Verfahren (DIRK-Verfahren) zu nutzen:

$$\begin{array}{c|cccccc} c_1 & a_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ c_2 & a_{21} & a_{22} & 0 & \cdots & 0 \\ c_3 & a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & & \\ c_s & a_{s1} & a_{s2} & \cdots & & a_{ss} \\ \hline & b_1 & b_2 & \cdots & b_{s-1} & b_s \end{array}$$

In DIRK-Verfahren hat man s unabhängige nichtlineare Gleichungen für die Steigungen zu lösen. In der Gleichung für $K_i(x, y)$ kommen nur $K_1(x, y), \dots, K_i(x, y)$ vor, wobei man $K_1(x, y), \dots, K_{i-1}(x, y)$ bereits berechnet hat. □

¹⁹Rehuel Lobatto (1797 – 1866)

²⁰John Crank (1916 – 2006)

²¹P. Nicolson

Bemerkung 6.106 *Ausblick.* Etwa die Hälfte der Vorlesung Numerik II wird das Thema der numerischen Approximation von Anfangwertproblemen für gewöhnliche Differentialgleichungen vertiefen. Einige Aspekte sind

- Schrittweitenkontrolle: wie kann man für jeden Schritt eine angepasste Schrittweite wählen,
- Stabilitätstheorie für sogenannte steife Differentialgleichungen, darauf aufbauend die Untersuchung der Frage, wann ist die Verwendung expliziter Verfahren günstig und wann die Verwendung impliziter Verfahren,
- Mehrschrittverfahren.

□